

Examen de Matemáticas 1º Bachillerato (CS)

Febrero 2021

Problema 1 Dada la función

$$f(x) = \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4}$$

Se pide:

- Calcular su dominio.
- Calcular sus puntos de corte con los ejes coordenados.
- Calcular su signo.
- Calcular su simetría.
- Calcular sus asíntotas.
- Calcular sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, calculando sus extremos relativos.
- Calcular sus intervalos de concavidad y convexidad, calculando sus puntos de inflexión.
- Representación gráfica.
- Calcular las rectas tangente y normal a f en el punto de abcisa $x = 3$.

Solución:

a) Dominio de f : $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{\pm 2\}$

b) Puntos de Corte

• Corte con el eje OX hacemos $f(x) = 0 \implies 5x^2 - 500 = 0 \implies (10, 0), (-10, 0)$.

• Corte con el eje OY hacemos $x = 0 \implies f(0) = 125 \implies (0, 125)$.

c)

	$(-\infty, -10)$	$(-10, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, 10)$	$(10, +\infty)$
signo	+	-	+	-	+

d) $f(-x) = f(x) \implies$ la función es PAR.

e) Asíntotas:

• **Verticales:** $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = \left[\frac{-480}{0^-} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = \left[\frac{-480}{0^+} \right] = -\infty$$

$$x = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = \left[\frac{-480}{0^+} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = \left[\frac{-480}{0^-} \right] = +\infty$$

• **Horizontales:** $y = 5$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 500}{x^2 - 4} = 5$$

• **Oblicuas:** No hay por haber horizontales.

f) $f'(x) = \frac{960x}{(x^2 - 4)^2} = 0 \implies x = 0$

	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	-	+
$f(x)$	decreciente ↘	creciente ↗

La función es creciente en el intervalo $(0, 2) \cup (2, \infty)$.

La función es decreciente en el intervalo $(-\infty, -2) \cup (-2, 0)$.

La función tiene un mínimo en el punto $(0, 125)$.


g) $f''(x) = -\frac{960(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3} = 0 \implies 3x^2 + 1 = 0$ No tiene solución y, por tanto, no hay puntos de inflexión.

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, +\infty)$
$f''(x)$	-	+	-
$f(x)$	convexa ∩	cóncava ∪	convexa ∩

Convexa : $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

Cóncava: $(-2, 2)$

h) Representación:



i) Calcular las rectas tangente y normal a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 3$:

Como $m = f'(3) = 576/5$ tenemos que

$$\text{Recta Tangente : } y + 91 = \frac{576}{5}(x - 3)$$

$$\text{Recta Normal : } y + 91 = -\frac{5}{576}(x - 3)$$

Como $f(3) = -91$ las rectas pasan por el punto $(3, -91)$.

