

## Examen de Matemáticas 2º Bachillerato (CN)

Mayo 2009

---

---

**Problema 1** Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + bx + a & \text{si } x < 1 \\ ax^2 - bx + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Hallar  $a$  y  $b$  de manera que  $f$  cumpla las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo  $[0, 2]$ . Encontrar aquellos puntos que el teorema asegura su existencia.

**Solución:**

1.  $f$  es continua en ambas ramas, para cualquier valor de  $a$  y  $b$ , hay que calcular  $a$  y  $b$  para afirmar la continuidad en  $x = 1$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + bx + a = 1 + b + a \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} ax^2 - bx + 3 = a - b + 3 \end{cases} \implies b = 1$$

2.  $f$  es derivable en ambas ramas, para cualquier valor de  $a$  y  $b$ , hay que calcular  $a$  y  $b$  para afirmar la derivabilidad en  $x = 1$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + b & \text{si } x < 1 \\ 2ax - b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$
$$\begin{cases} f'(1^-) = 2 + b \\ f'(1^+) = 2a - b \end{cases} \implies a - b = 1$$

- 3.

$$\begin{cases} b = 1 \\ a - b = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$$

4. Tenemos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 2 & \text{si } x < 1 \\ 2x^2 - x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Esta función cumple las condiciones del Teorema del Valor Medio, es decir, es continua en el intervalo  $[0, 2]$  y derivable en el  $(0, 2)$ . El Teorema afirma que existe al menos un punto  $c \in (0, 2)$  que cumple

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{9 - 2}{2} = \frac{7}{2}.$$

Si cogemos la primera rama  $x < 1$ :

$$f'(c) = 2c + 1 = 7/2 \implies c = 5/4 \notin (0, 1)$$

Si cogemos la segunda rama  $x \geq 1$ :

$$f'(c) = 4c - 1 = 7/2 \implies c = 9/8 \in (1, 2)$$

El punto  $c \in (0, 2)$  al que hace referencia el teorema será  $c = 9/8$ .

**Problema 2** Hallar una función polinómica de tercer grado tal que tenga un extremo relativo en  $(1, -1)$  y un punto de inflexión en  $(0, 2)$

**Solución:**


$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \quad f''(x) = 6ax + 2b$$

$$\begin{cases} f(1) = -1 \implies a + b + c + d = -1 \\ f(0) = 2 \implies d = 2 \\ f'(1) = 0 \implies 3a + 2b + c = 0 \\ f''(0) = 0 \implies 2b = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 3/2 \\ b = 0 \\ c = -9/2 \\ d = 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{3}{2}x^3 - \frac{9}{2}x + 2,$$

**Problema 3** Hallar el área encerrada por la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x}$  las rectas  $x = 1$ ,  $x = 4$  e  $y = 0$ .

**Solución:**



$$x^2 - 4x + 3 = 0 \implies x = 1, \quad x = 3$$

$$F(x) = \int \frac{x^2 - 4x + 3}{x} dx = \frac{x^2}{2} - 4x + 3 \ln|x|$$

$$S_1 = \int_1^3 f(x) dx = \left. \frac{x^2}{2} - 4x + 3 \ln |x| \right|_1^3 = -4 + 3 \ln 3$$

$$S_2 = \int_3^4 f(x) dx = \left. \frac{x^2}{2} - 4x + 3 \ln |x| \right|_3^4 = -\frac{1}{2} + 3 \ln \left( \frac{3}{4} \right)$$

$$S = |S_1| + |S_2| = 4 - 3 \ln 3 - \frac{1}{2} + 3 \ln \left( \frac{3}{4} \right) = \frac{7}{2} - 6 \ln \left( \frac{3}{2} \right) \simeq 1,067 u^2$$

**Problema 4** Calcular las integrales:

1.  $\int \frac{x^3 + 5}{x^2 - x - 2} dx$

2.  $\int x \sin(2x) dx$

**Solución:**

1.  $\int \frac{x^3 + 5}{x^2 - x - 2} dx = \frac{x^2}{2} + x + \frac{13 \ln(x - 2)}{3} - \frac{\ln(x + 1)}{3}$

2.  $\int x \sin(2x) dx = \frac{\sin(2x) - 2x \cos(2x)}{4}$