

# Examen de Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II (Ordinaria 2024)

## INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá responder razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se le proponen.

Cada ejercicio se valorará sobre 2 puntos, y si consta de dos apartados, cada apartado se valorará sobre 1 punto.

**DURACIÓN: 90 minutos.**

**Problema 1** (2 puntos) Se considera la matriz  $A$  dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 - a & -2 & -1 \\ 1 & a & 1 \\ 2 & -2 & a \end{pmatrix}$$

- Determine los valores del parámetro  $a \in \mathbb{R}$  para los que exista la inversa de  $A$ .
- Para  $a = -2$  calcule  $A^{-1}$ .

**Problema 2** (2 puntos) Sea  $f(x)$  una función real de variable real cuya derivada viene dada por la siguiente expresión:

$$f'(x) = x^2 + x - 2$$

- Obtenga la expresión de la función  $f(x)$  sabiendo que pasa por el punto  $(0, 2)$ .
- Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función  $f(x)$ , clasificando sus extremos relativos, si procede.

**Problema 3** (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por la siguiente expresión:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + e^2 & \text{si } x < 1 \\ ae^{2x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- Halle el valor del parámetro  $a \in \mathbb{R}$  para que  $f(x)$  sea continua en todo su dominio.
- Para  $a = 1$ , calcule el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de la función anterior, el eje de abscisas y las rectas  $x = 1$  y  $x = 2$ .

**Problema 4** (2 puntos) Se considera la siguiente función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 9}$$

- Determine las asíntotas de la función.
- Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa  $x = 0$ .

**Problema 5** (2 puntos) Se dispone de 60 gramos de ácido acetilsalicílico para elaborar tabletas en dos formatos, de 4 gramos y de 3 gramos respectivamente. Se necesitan al menos tres tabletas de 4 gramos, al menos ocho tabletas de 3 gramos y al menos el doble de tabletas de 3 gramos que de 4 gramos. Cada tableta de 4 gramos proporciona un beneficio de 1,5 euros y cada tableta de 3 gramos proporciona un beneficio de 1 euro. ¿Cuántas tabletas deberían fabricarse de cada tipo para maximizar el beneficio? ¿Cuál es el beneficio máximo?

**Problema 6** (2 puntos) Un equipo de baloncesto regional ha vendido tres tipos de entradas para su último partido. Las entradas generales se han vendido a 10 euros, las entradas para estudiantes a 8 euros y las entradas infantiles a 5 euros. El equipo ha conseguido vender 600 entradas y ganar 4900 euros. Además, se sabe que ha vendido el doble de entradas generales que de entradas infantiles. Plantee el sistema de ecuaciones y resuelva para calcular el número de entradas vendidas de cada tipo.

**Problema 7** (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{cases} 2x + y + z = a \\ x + ay + z = a + 1 \\ x + y + az = 2 \end{cases}$$

- Discuta el sistema en función de los valores del parámetro  $a$ .
- Resuelva el sistema de ecuaciones para  $a = 1$ .

**Problema 8** (2 puntos) En un festival de música con 200 asistentes se observa que a 90 personas les gusta el pop, a 70 el techno y a 30 les gustan ambos géneros. Eligiendo al azar a un asistente del festival, calcule la probabilidad de que:

- Le guste al menos uno de los dos géneros musicales.
- Le guste el techno pero no el pop.

**Problema 9** (2 puntos) La cantidad de agua absorbida por un tipo particular de planta acuática se puede modelar con una variable aleatoria con distribución normal de media  $\mu$  y desviación típica  $\sigma = 8$  ml.

- Se selecciona aleatoriamente una muestra de 25 plantas acuáticas y se determina que la cantidad media de agua absorbida es de 120 ml. Calcule un intervalo de confianza del 95 % para la media de la cantidad de agua absorbida por este tipo de planta acuática.
- Determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que el error máximo, en la estimación de la media de la cantidad de agua absorbida, sea menor que 1 ml, con un nivel de confianza del 90 %.

**Problema 10** (2 puntos) En tres tanques,  $A$ ,  $B$  y  $C$ , de una piscifactoría se crían, respectivamente, el 35 %, el 20 % y el 45 % de los alevines de salmón noruego. Se sabe que el 15 % de los alevines criados en el tanque  $A$ , el 30 % de los alevines criados en el tanque  $B$  y el 25 % de los alevines criados en el tanque  $C$  miden más de 35 mm. Eligiendo al azar un alevín de salmón noruego, calcule la probabilidad de que:

- Mida más de 35 mm.
- Sabiendo que no mide más de 35 mm, proceda del tanque  $C$ .