

Problemas de Selectividad de Matemáticas
aplicadas a la Ciencias Sociales
Comunidad de Madrid
Enunciados

Isaac Musat Hervás

18 de abril de 2017

www.musat.net

www.musat.net

Índice general

1. Álgebra	7
1.1. Año 2000	7
1.2. Año 2001	8
1.3. Año 2002	9
1.4. Año 2003	10
1.5. Año 2004	10
1.6. Año 2005	11
1.7. Año 2006	12
1.8. Año 2007	13
1.9. Año 2008	13
1.10. Año 2009	14
1.11. Año 2010	15
1.12. Año 2011	16
1.13. Año 2012	18
1.14. Año 2013	20
1.15. Año 2014	22
1.16. Año 2015	25
1.17. Año 2016	27
2. Programación lineal	31
2.1. Año 2000	31
2.2. Año 2001	32
2.3. Año 2002	33
2.4. Año 2003	34
2.5. Año 2004	34
2.6. Año 2005	35
2.7. Año 2006	36
2.8. Año 2007	37
2.9. Año 2008	37
2.10. Año 2009	38
2.11. Año 2010	39
2.12. Año 2011	40
2.13. Año 2012	40

2.14. Año 2013	41
2.15. Año 2014	42
2.16. Año 2015	43
2.17. Año 2016	44
3. Análisis	47
3.1. Año 2000	47
3.2. Año 2001	49
3.3. Año 2002	50
3.4. Año 2003	51
3.5. Año 2004	52
3.6. Año 2005	54
3.7. Año 2006	55
3.8. Año 2007	57
3.9. Año 2008	58
3.10. Año 2009	59
3.11. Año 2010	61
3.12. Año 2011	63
3.13. Año 2012	65
3.14. Año 2013	67
3.15. Año 2014	71
3.16. Año 2015	74
3.17. Año 2016	78
4. Probabilidad	83
4.1. Año 2000	83
4.2. Año 2001	84
4.3. Año 2002	86
4.4. Año 2003	88
4.5. Año 2004	89
4.6. Año 2005	90
4.7. Año 2006	92
4.8. Año 2007	93
4.9. Año 2008	94
4.10. Año 2009	96
4.11. Año 2010	97
4.12. Año 2011	99
4.13. Año 2012	101
4.14. Año 2013	104
4.15. Año 2014	107
4.16. Año 2015	109
4.17. Año 2016	111

5. Estadística	115
5.1. Año 2000	115
5.2. Año 2001	117
5.3. Año 2002	119
5.4. Año 2003	120
5.5. Año 2004	121
5.6. Año 2005	122
5.7. Año 2006	124
5.8. Año 2007	125
5.9. Año 2008	126
5.10. Año 2009	128
5.11. Año 2010	130
5.12. Año 2011	132
5.13. Año 2012	134
5.14. Año 2013	137
5.15. Año 2014	140
5.16. Año 2015	143
5.17. Año 2016	146

www.musat.net

Capítulo 1

Álgebra

1.1. Año 2000

Problema 1.1.1 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal

$$\begin{cases} x - y = a \\ x + a^2 z = 2a + 1 \\ x - y + a(a - 1)z = 2a \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los distintos valores del parámetro real a .
- Resuélvase dicho sistema para $a = 3$.

(Modelo 2000 - Opción A)

Problema 1.1.2 (3 puntos) Siendo a un número real cualquiera, se define el sistema

$$\begin{cases} x + 2y - az = 1 \\ -y + z = 0 \\ ax + z = a \end{cases}$$

- Discútase dicho sistema en función del valor de a
- Encuéntrese todas las soluciones para $a = 1$

(Junio 2000 - Opción A)

Problema 1.1.3 (3 puntos) Una empresa desea disponer de dinero en efectivo en euros, dólares y libras esterlinas. El valor total entre las tres monedas ha de ser igual a 264000 euros. Se quiere que el valor del dinero disponible en euros sea el doble del valor del dinero en dólares, y que el valor del dinero en libras esterlinas sea la décima parte del dinero en euros.

Si se supone que una libra esterlina es igual a 1,5 euros y un dólar es igual a 1,1 euros, se pide determinar la cantidad de euros, dólares y libras esterlinas que la empresa ha de tener disponible.

(Septiembre 2000 - Opción A)

1.2. Año 2001

Problema 1.2.1 (3 puntos) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

- Compruébese que B es la inversa de A .
- Calcúlese la matriz $(A - 2I)^2$.
- Calcúlese la matriz X tal que $AX = B$.

(Modelo 2001 - Opción A)

Problema 1.2.2 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal:

$$\begin{aligned} mx + my &= 6 \\ x + (m - 1)y &= 3 \end{aligned}$$

- Discútase el sistema según los distintos valores del parámetro real m .
- Resúlvase dicho sistema para $m = 2$:

(Modelo 2001 - Opción B)

Problema 1.2.3 (3 puntos) Considérese el sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los valores de a
- Resuélvase el sistema para $a = -1$

(Junio 2001 - Opción A)

Problema 1.2.4 (3 puntos) Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 5 & -4 & -4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

- Determinése si A y B son inversibles y, en su caso, calcúlese la matriz inversa.
- Resuélvase la ecuación matricial $XA - B = 2I$, siendo I la matriz identidad de orden tres.
- Calcúlese A^{86}

(Septiembre 2001 - Opción A)

Problema 1.2.5 (3 puntos). Un hipermercado inicia una campaña de ofertas. En la primera de ellas descuenta un 4% en un cierto producto A , un 6% en el producto B y un 5% en el producto C . A las dos semanas pone en marcha la segunda oferta descontando un 8% sobre el precio inicial de A , un 10% sobre el precio inicial de B y un 6% sobre el precio inicial de C . Se sabe que si un cliente compra durante la primera oferta un producto A , dos B y tres C , se ahorra 16 euros respecto del precio inicial. Si compra tres productos A , uno B y cinco C en la segunda oferta, el ahorro es de 29 euros. Si compra un producto A , uno B y uno C , sin ningún tipo de descuento, debe abonar 135 euros.

Calcúlese el precio de cada producto antes de las ofertas.

(Septiembre 2001 - Opción B)

1.3. Año 2002

Problema 1.3.1 (3 puntos) Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x - 4y - az = -2 \\ - y - z = 0 \\ ax + + 2z = 2 \end{cases}$$

- Discutir el sistema en función de los valores de a .
- Resolver el sistema para el valor $a = 2$.

(Modelo 2002 - Opción A)

Problema 1.3.2 (3 puntos) Dadas las matrices

$$A = (2, 1, -1), \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Calcular las matrices $M = AB$ y $N = BA$.
- Calcular P^{-1} , siendo $P = (N - I)$, donde I representa la matriz identidad.
- Resolver el sistema $PX = C$.

(Junio 2002 - Opción A)

Problema 1.3.3 (3 puntos) Encontrar todas las matrices X tales que $AX = XA$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

(Septiembre 2002 - Opción A)

1.4. Año 2003

Problema 1.4.1 (3 puntos) Estudiar y resolver el siguiente sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} x+2y+z=0 \\ -x-y=1 \\ -y-z=-1 \end{cases}$$

(Junio 2003 - Opción A)

Problema 1.4.2 (3 puntos) Calcular los valores de a para los cuales la inversa de la matriz

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} a & 4 \\ -4 & a \end{pmatrix}$$

coincide con su transpuesta.

(Septiembre 2003 - Opción A)

1.5. Año 2004

Problema 1.5.1 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro m :

$$\begin{cases} 2x+y-z=2 \\ x+y+2z=5 \\ -x+(m+2)z=3 \end{cases}$$

a) Discutir el sistema para los distintos valores de m .

b) Resolver el sistema para $m=3$.

(Modelo 2004 - Opción A)

Problema 1.5.2 (3 puntos) Hallar todas las matrices

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}; \quad a, b, c \in R$$

que satisfacen la ecuación matricial

$$X^2 = 2X$$

(Junio 2004 - Opción B)

Problema 1.5.3 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real m :

$$\begin{cases} mx+y-3z=5 \\ -x+y+z=-4 \\ x+my-mz=1 \end{cases}$$

a) Discútase el sistema según los diferentes valores del parámetro m .

b) Resuélvase el sistema para $m = 2$.

(Septiembre 2004 - Opción A)

1.6. Año 2005

Problema 1.6.1 (3 puntos) Se dice que una matriz cuadrada es ortogonal si $AA^T = I$

a) Estudiar si la matriz A es ortogonal

$$A = \begin{pmatrix} 4/5 & 0 & -3/5 \\ 3/5 & 0 & 4/5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Siendo A la matriz del apartado anterior, resolver el sistema

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Nota: La notación A^T significa matriz traspuesta de A .

(Modelo 2005 - Opción A)

Problema 1.6.2 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ x - ky - 3z = 0 \\ 5x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

Se pide:

a) Discutir el sistema para los distintos valores de k .

b) Resolver el sistema en los casos en los que sea posible.

(Junio 2005 - Opción A)

Problema 1.6.3 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones que depende del parámetro real p

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ -x + 2y + pz = -3 \\ x - 2y - z = p \end{cases}$$

a) Discutir el sistema según los distintos valores de p .

b) Resolver el sistema para $p = 2$.

(Septiembre 2005 - Opción B)

1.7. Año 2006

Problema 1.7.1 (3 puntos) Sea el sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro a

$$\begin{cases} x+ & y+ & (a+1)z = & 9 \\ 3x- & 2y+ & & z = & 20a \\ x+ & y+ & & 2az = & 9 \end{cases}$$

- Discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro a .
- Resolver el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones.
- Resolver el sistema para $a = 2$.

(Modelo 2006 - Opción A)

Problema 1.7.2 (3 puntos) Encontrar todas las matrices X cuadradas 2×2 que satisfacen la igualdad

$$XA = AX$$

en cada uno de los casos siguientes:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

(Junio 2006 - Opción B)

Problema 1.7.3 (Puntuación máxima: 3 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones lineales, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x+ & y+ & 2z = & 2 \\ -2x+ & 3y+ & & z = & 1 \\ -x+ & ay+ & & 3z = & 3 \end{cases}$$

- Discutir el sistema para los distintos valores de a .
- Resolver el sistema para $a = 2$.

(Septiembre 2006 - Opción B)

1.8. Año 2007

Problema 1.8.1 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2y - 2z = 3 \\ 2x + 2y + az = 8 \end{cases}$$

- Discutir el sistema para los distintos valores de a .
- Resolver el sistema para $a = 4$.

(Junio 2007 - Opción A)

Problema 1.8.2 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + ay + z = 1 \\ \quad 2y + az = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

- Discutir el sistema para los distintos valores de a .
- Resolver el sistema para $a = 3$ y $a = 1$.

(Septiembre 2007 - Opción A)

1.9. Año 2008

Problema 1.9.1 (3 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & n & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $X =$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Hallar los valores de n para los que la matriz A tiene inversa.
- Resolver la ecuación matricial $A \cdot X = B$ para $n = 3$

(Modelo 2008 - Opción A)

Problema 1.9.2 (3 puntos) Un agricultor tiene repartidas sus 10 hectáreas de terreno de barbecho, cultivo de trigo y cultivo de cebada. La superficie dedicada al trigo ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a la cebada, mientras que en barbecho tiene 6 hectáreas menos que la superficie total dedicada al cultivo de trigo y cebada. ¿Cuántas hectáreas tiene dedicadas a cada uno de los cultivos y cuántas están en barbecho?

(Junio 2008 - Opción A)

Problema 1.9.3 (3 puntos) Una empresa instala casas prefabricadas de tres tipos A , B y C . Cada casa de tipo A necesita 10 horas de albañilería, 2 de fontanería y 2 de electricista. Cada casa de tipo B necesita 15 horas de albañilería, 4 de fontanería y 3 de electricista. Cada casa de tipo C necesita 20 horas de albañilería, 6 de fontanería y 5 de electricista. La empresa emplea exactamente 270 horas de trabajo al mes de albañilería, 68 de fontanería y 58 de electricista. ¿Cuántas casas de cada tipo instala la empresa en un mes? (Septiembre 2008 - Opción A)

1.10. Año 2009

Problema 1.10.1 (3 puntos) Se considera la matriz dependiente del parámetro real k :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & k \\ k & 1 & k \end{pmatrix}$$

- Determinése los valores de k para los cuales A tiene inversa.
- Para $k = 2$, calcúlese (si existe) A^{-1} .
- Para $k = 1$, calcúlese $(A - 2A^T)^2$.

Nota: La notificación A^T representa a la matriz transpuesta de A . (Modelo 2009 - Opción A)

Problema 1.10.2 (3 puntos) Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando para ello un total de 7500 euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta 50 euros y el de un edredón 80 euros. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel?

(Modelo 2009 - Opción B)

Solución:

Problema 1.10.3 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + y + kz = 4 \\ 2x - y + 2z = 5 \\ -x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los distintos valores del parámetro k .
- Resúelvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.
- Resúelvase el sistema para $k = 0$.

(Junio 2009 - Opción A)

Problema 1.10.4 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependientes del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + ky + z = 3 \\ kx - \quad \quad 3z = 6 \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
- Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.
- Resuélvase el sistema para $k = 3$.

(Septiembre 2009 - Opción B)

1.11. Año 2010

Problema 1.11.1 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + ky + z = 1 \\ \quad 2y + kz = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los distintos valores de k .
- Resuélvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.
- Resuélvase el sistema para $k = 3$.

(Modelo 2010 - Opción A)

Problema 1.11.2 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} kx - 2y + 7z = 8 \\ x - y + kz = 2 \\ -x + y + z = 2 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los distintos valores de k .
- Resuélvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.
- Resuélvase el sistema para $k = 0$.

(Junio 2010 - Opción B)

Problema 1.11.3 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones dependiente de un parámetro real a :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \\ -4 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 22 \\ 7a \end{pmatrix}$$

- Discútase el sistema para los diferentes valores del parámetro a .
- Resuélvase el sistema para el valor de a para el cual el sistema tiene infinitas soluciones.
- Resuélvase el sistema para $a = 0$.

(Septiembre 2010 - Opción A)

1.12. Año 2011

Problema 1.12.1 (3 puntos) Un estudiante ha gastado un total de 48 euros en la compra de una mochila, un bolígrafo y un libro. Si el precio de la mochila se redujera a la sexta parte, el del bolígrafo a la tercera parte y el del libro a la séptima parte de sus respectivos precios iniciales, el estudiante pagaría un total de 8 euros por ellos. Calcular el precio de la mochila, del bolígrafo y del libro, sabiendo que la mochila cuesta lo mismo que el total del bolígrafo y el libro.

(Modelo 2011 - Opción A)

Problema 1.12.2 (3 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & a & 0 \\ 0 & -6 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Calcúlense los valores de a para los cuales la matriz A no tiene inversa.
- Para $a = 2$, calcúlese la matriz inversa A^{-1} .
- Para $a = 2$, calcúlese, si existe, la matriz X que satisface $AX = B$.

(Modelo 2011 - Opción B)

Problema 1.12.3 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + y + z = a \\ ay + z = 1 \\ ax + y + az = a \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- b) Resúlvase el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones.
- c) Resúlvase el sistema para $a = 3$

(Junio 2011 - Opción A)

Problema 1.12.4 (3 puntos). Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}; I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlense a, b para que se verifique la igualdad $AB = BA$.
- b) Calcúlense c, d para que se verifique la igualdad $A^2 + cA + dI = O$.
- c) Calcúlense todas las soluciones del sistema lineal:

$$(A - I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Septiembre 2011 - Opción B)

Problema 1.12.5 (3 puntos). Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} 4x + 3y + 5z = 5 \\ x + y + 3z = 1 \\ 2x + ay + (a^2 - 2)z = 3 \end{cases}$$

- a) Escribese el sistema en forma matricial.
- b) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- c) Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción A)

Problema 1.12.6 (3 puntos). Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 1 & -2 \\ -11 & 3 & -8 \end{pmatrix}$$

- a) Calcúlese $A^{-1}A^T$.- **Nota.**- La notación A^T representa a la matriz transpuesta de A .
- b) Resuélvase la ecuación matricial: $\frac{1}{4}A^2 - AX = B$.

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción B)

1.13. Año 2012

Problema 1.13.1 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real k

$$\begin{cases} x + ky + kz = k \\ x + y + z = k \\ ky + 2z = k \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
- Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.
- Resuélvase el sistema para $k = 4$.

(Modelo 2012 - Opción A)

Problema 1.13.2 (3 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & a \end{pmatrix}$

- Calcúlense los valores de a para los cuales no existe la matriz inversa A^{-1} .
- Para $a = 2$, calcúlese la matriz $B = (A^{-1}A^T)^2$.
- Para $a = 2$, calcúlese la matriz X que satisface la ecuación matricial:

$$AX - A^2 = A^T$$

Nota.- A^T representa a la matriz traspuesta de A .

(Modelo 2012 - Opción B)

Problema 1.13.3 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + ay - 7z = 4a - 1 \\ x + (1+a)y - (a+6)z = 3a + 1 \\ ay - 6z = 3a - 2 \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los diferentes valores de a .
- Resuélvase el sistema en el caso en el que tiene infinitas soluciones.
- Resuélvase el sistema en el caso $a = -3$.

(Junio 2012 - Opción A)

Problema 1.13.4 (3 puntos) Un estadio de fútbol con capacidad para 72000 espectadores está lleno durante la celebración de un partido entre los equipos A y B . Unos espectadores son socios del equipo A , otros lo son del equipo B , y el resto no son socios de ninguno de los equipos que están jugando. A través de la venta de localidades sabemos lo siguiente:

- No hay espectadores que sean socios de ambos equipos simultáneamente.
- Por cada 13 socios de alguno de los dos equipos hay 3 espectadores que no son socios.
- Los socios del equipo B superan en 6500 a los socios del equipo A .

¿Cuántos socios de cada equipo hay en el estadio viendo el partido?
(Junio 2012 - Opción B)

Problema 1.13.5 (3 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & k \end{pmatrix}$, $X =$

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, se pide:

- Para $k = 4$, calcúlese el determinante de la matriz $3A^2$.
- Para $k = 2$, calcúlese (si existe) la matriz inversa A^{-1} .
- Discútase la existencia de solución del sistema lineal $AX = B$ según los diferentes valores del parámetro k .

(Junio 2012(coincidente) - Opción A)

Problema 1.13.6 (3 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones, dependiente del parámetro real k :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + ky + 2z = 5 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
- Resuélvase el sistema para $k = 0$.
- Resuélvase el sistema para $k = 2$.

(Septiembre 2012 - Opción B)

1.14. Año 2013

Problema 1.14.1 (2 puntos) Discútase el sistema siguiente en función del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - y & = a \\ x + az & = 0 \\ 2x - y + a^2z & = 1 \end{cases}$$

(Modelo 2013 - Opción A)

Problema 1.14.2 (2 puntos) Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

a) Obténgase A^{2007} .

b) Hállese la matriz B tal que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 11 & 5 & 1 \\ -7 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

(Modelo 2013 - Opción B)

Problema 1.14.3 (2 puntos) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcúlese A^{-1}

b) Resuélvase el sistema de ecuaciones dado por $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(Junio 2013 - Opción A)

Problema 1.14.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax - 2y & = 2 \\ 3x - y - z & = -1 \\ x + 3y + z & = 1 \end{cases}$$

a) Discútase en función de los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.

b) Resuélvase para $a = 1$.

(Junio 2013 - Opción B)

Problema 1.14.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -2 \\ x + ay = -2a - 1 \\ 4x + y + 5z = -1 \end{cases}$$

- a) Resuélvase en el caso $a = 1$.
 b) Discútase en función del parámetro $a \in \mathbb{R}$.

(Junio 2013 (coincidente) - Opción A)

Problema 1.14.6 (2 puntos) Encuéntrese la matriz X que verifica

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 11 & 3 \\ -7 & -2 \end{pmatrix}$$

(Junio 2013 (coincidente) - Opción B)

Problema 1.14.7 (2 puntos) Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 8 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcúlese la matriz inversa de A
 b) Resuélvase la ecuación matricial $A \cdot X = B - I$; donde I es la matriz identidad.

(Septiembre 2013 - Opción A)

Problema 1.14.8 (2 puntos) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales, dependiente del parámetro k :

$$\begin{cases} kx + y = 0 \\ x + ky - 2z = 1 \\ kx - 3y + kz = 0 \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores de k .
 b) Resuélvase el sistema para $k = 1$.

(Septiembre 2013 - Opción B)

Problema 1.14.9 (2 puntos) Hemos ido tres días seguidos al bar de la Universidad. El primer día tomamos 3 cafés, 2 refrescos de cola y 3 batidos de cacao, el precio fue de 7 euros. El segundo día tomamos 1 café, 2 refrescos de cola y 2 batidos de cacao, el precio total fue de 5 euros. Por último, el tercer día tomamos 2 cafés y un batido de cacao, el precio fue de 2 euros. Justifíquese razonadamente si con estos datos podemos determinar o no el precio de un café, de un refresco de cola y de un batido de cacao, suponiendo que estos precios no han variado en los tres días.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 1.14.10 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2x - 2ay + z = 1 \\ x + (2 + a)y + z = 0 \\ 3x + a^2y + 2z = a \end{cases}$$

- Discútase, en función del parámetro real a .
- Resuélvase el sistema para $a = 0$.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción B)

Problema 1.14.11 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- Calcúlese A^2 , A^3 , A^{20} .
- Hállese la matriz B tal que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción B)

1.15. Año 2014

Problema 1.15.1 (2 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ a & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

- Hállense los valores de a y b para los que se cumple $A + B + AB = C$.
- Para el caso en el que $a = 1$ y $b = 2$, determínese la matriz X que verifica $BX - A = I$; donde I es la matriz identidad.

(Modelo 2014 - Opción A)

Problema 1.15.2 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + 3y + z = 1 \\ 2x + 6y + z = 0 \\ -x + ay + 4z = 1 \end{cases}$$

- Discútase en función de los valores del parámetro $a \in R$.
- Resuélvase para $a = 0$.

(Modelo 2014 - Opción B)

Problema 1.15.3 (2 puntos) Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calcúlese $(A^t B)^{-1}$, donde A^t denota a la traspuesta de la matriz A .

b) Resuélvase la ecuación matricial $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

(Junio 2014 - Opción A)

Problema 1.15.4 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = 2 \\ 3x + 4y + 2z = a \\ 2x + 3y - z = 1 \end{cases}$$

a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a .

b) Resuélvase el sistema en el caso $a = -1$.

(Junio 2014 - Opción B)

Problema 1.15.5 (2 puntos) Considérese la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Calcúlese A^1 .

b) Determínese la matriz X tal que $AX = A^{-1}$

(Junio 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 1.15.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax + 2y + z = 2 \\ 2x + 4y = 1 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

a) Discútase para los diferentes valores de $a \in \mathbb{R}$.

b) Resuélvase para $a = 2$.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción B)

Problema 1.15.7 (2 puntos) Considérese el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real λ :

$$\begin{cases} 2x - \lambda y + z = -\lambda \\ 4x - 2\lambda y + 2z = \lambda - 3 \end{cases}$$

- Determinense los valores del parámetro real λ que hacen que el sistema sea incompatible.
- Resuélvase el sistema para $\lambda = 1$.

(Septiembre 2014 - Opción A)

Problema 1.15.8 (2 puntos) Considérese la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calcúlese $(A \cdot A^T)^{200}$.
- Calcúlese $(A \cdot A^T - 3I)^{-1}$.

Nota: A^T denota a la traspuesta de la matriz A . I es la matriz identidad de orden 3.

(Septiembre 2014 - Opción B)

Problema 1.15.9 (2 puntos) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ y

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Calcúlese B^{31} .
- Calcúlese el determinante de la matriz $A^{-1} \cdot B$.

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 1.15.10 (2 puntos) Considérese el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro a :

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x - ay = 4 \end{cases}$$

- Discútase en función de los valores del parámetro $a \in R$.
- Resuélvase para $a = 1$.

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción B)

1.16. Año 2015

Problema 1.16.1 (2 puntos) Se considera $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

- a) Calcúlese A^{-1} .
- b) Calcúlese $A^T \cdot A$.

Nota: A^T denota la traspuesta de la matriz A .
(Modelo 2015 - Opción A)

Problema 1.16.2 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + ay + az = 1 \\ x + 4ay + z = 2a \end{cases}$$

- a) Discútase el sistema según los diferentes valores del a .
- b) Resuélvase el sistema en el caso $a = -1$.

(Modelo 2015 - Opción B)

Problema 1.16.3 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} 3x + y - z = 8 \\ 2x + az = 3 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b) Resuélvase para $a = 1$.

(Junio 2015 - Opción A)

Problema 1.16.4 (2 puntos) Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & k & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Estúdiase el rango de A según los valores del parámetro real k .
- b) Calcúlese, si existe, la matriz inversa de A para $k = 3$.

(Junio 2015 - Opción B)

Problema 1.16.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ ax + y + z = 1 \\ x + ay + 2z = 1 \end{cases}$$

- Discútase para los diferentes valores de $a \in \mathbb{R}$.
- Resuélvase para $a = 1$.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 1.16.6 (2 puntos) Se consideran las matrices dependientes del parámetro real a

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Determinense los valores de a para los que la matriz $A \cdot B$ admite inversa.
- Para $a = 0$, resuélvase la ecuación matricial $(A \cdot B) \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

(Junio 2015 (coincidente)- Opción B)

Problema 1.16.7 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- Calcúlese A^{15} e indíquese si la matriz A tiene inversa.
- Calcúlese el determinante de la matriz $(B \cdot A^t \cdot B^{-1} - 2 \cdot Id)^3$.

Nota: A^t denota la matriz traspuesta de A . Id es la matriz identidad de orden 2.

(Septiembre 2015 - Opción A)

Problema 1.16.8 (2 puntos) Considérese el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = a + 1 \\ ax + y + z = 1 \\ x + ay + az = a \end{cases}$$

a) Discútase el sistema en función de los valores de a .

b) Resuélvase el sistema para $a = 2$.

(Septiembre 2015 - Opción B)

Problema 1.16.9 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Calcúlese el determinante de la matriz $A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$.

b) Determínese la matriz X tal que $B \cdot A \cdot X = C$.

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 1.16.10 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 5y - z = 3 \\ x + 3y - 2z = a \end{cases}$$

a) Discútase para los diferentes valores del parámetro $a \in R$.

b) Resuélvase para $a = 1$.

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción B)

1.17. Año 2016

Problema 1.17.1 (2 puntos) Considérese la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ a & 0 & 8 \\ -1 & a & -6 \end{pmatrix}$

a) Determínese para qué valores de $a \in R$ es invertible A .

b) Resuélvase para $a = 0$ el sistema

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Modelo 2016 - Opción A)

Problema 1.17.2 (2 puntos) Determínese la matriz X que verifica

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot X$$

(Modelo 2016 - Opción A)

Problema 1.17.3 (2 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 2y - 3z = 3 \\ 3x + ay - 2z = 5 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los diferentes valores del a .
- Resuélvase el sistema en el caso $a = 2$.

(Modelo 2016 - Opción B)

Problema 1.17.4 (2 puntos) Considérense las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 7 & 4 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Calcúlese el determinante de la matriz $A \cdot C \cdot C^T \cdot A^{-1}$.
- Calcúlese la matriz $M = A \cdot B$. ¿Existe M^{-1} ?
Nota: C^T denota la matriz traspuesta de la matriz C .

(Junio 2016 - Opción A)

Problema 1.17.5 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + ay + 2z = 0 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los diferentes valores del $a \in \mathbb{R}$.
- Resuélvase para $a = 0$.

(Junio 2016 - Opción B)

Problema 1.17.6 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente de $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 3x + y + az = a - 2 \\ ax - y + z = a - 2 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

- Discútase el sistema para los diferentes valores del a .
- Resuélvase para $a = 0$.

(Junio 2016 - Opción A (Coincidentes))

Problema 1.17.7 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 1 & a & 2 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Id = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

siendo a un número real.

- Determinése a para que la matriz A admita inversa.
- Para $a = 1$, determinése la matriz X que verifica $A \cdot X + A = Id$.

(Junio 2016 - Opción B (Coincidentes))

Problema 1.17.8 (2 puntos) Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} k & -1 & 0 \\ -7 & k & k \\ -1 & -1 & k \end{pmatrix}$

- Estudíese para qué valores del parámetro real k la matriz A tiene inversa.
- Determinése, para $k = 1$, la matriz X tal que $XA = Id$.
Nota: Id denota la matriz identidad de tamaño 3×3 .

(Septiembre 2016 - Opción A)

Problema 1.17.9 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\begin{cases} (a-1)x + y + z = 1 \\ x + (a-1)y + (a-1)z = 1 \\ x + az = 1 \end{cases}$$

- Discútase el sistema según los valores del a .
- Resuélvase el sistema para $a = 3$.

(Septiembre 2016 - Opción B)

www.musat.net

Capítulo 2

Programación lineal

2.1. Año 2000

Problema 2.1.1 (3 puntos) Un artesano fabrica collares y pulseras. Hacer un collar le lleva dos horas y hacer una pulsera una hora. El material de que dispone no le permite hacer más de 50 piezas. Como mucho, el artesano puede dedicar al trabajo 80 horas. Por cada collar gana 5 euros y por cada pulsera 4 euros. El artesano desea determinar el número de collares y pulseras que debe fabricar para optimizar sus beneficios.

- Exprésese la función objetivo y las restricciones del problema.
- Represéntese gráficamente el recinto definido.
- Obtégase el número de collares y pulseras correspondientes al máximo beneficio.

(Modelo 2000 - Opción B)

Problema 2.1.2 (3 puntos) Una empresa especializada en la fabricación de mobiliario para casa de muñecas, produce cierto tipo de mesas y sillas que vende a 20 euros y 30 euros, respectivamente. Desea saber cuántas unidades de cada artículo debe fabricar diariamente un operario para maximizar los ingresos, teniéndose las siguientes restricciones:

El número total de unidades de los dos tipos no podrá exceder de 4 por día y operario.

Cada mesa requiere dos horas para su fabricación; cada silla, 3 horas. La jornada laboral máxima es de 10 horas.

El material utilizado en cada mesa cuesta 4 euros. El utilizado en cada silla cuesta 2 euros. Cada operario dispone de 12 euros diarios de material.

- a) Expresa la función objetivo y las restricciones del problema.
- b) Representa gráficamente la región factible y calcula los vértices de la misma.
- c) Razona si con estas restricciones un operario puede fabricar diariamente una mesa y una silla, y si esto le conviene a la empresa.
- d) Resuelve el problema

(Junio 2000 - Opción B)

Problema 2.1.3 (3 puntos). Una empresa que sirve comidas preparadas tiene que diseñar un menú utilizando dos ingredientes. El ingrediente A contiene 35 g de grasas y 150 Kilocalorías por cada 100 g de ingrediente, mientras que el B contiene 15 g de grasas y 100 Kilocalorías por cada 100 g. El coste es de 1,5 euros por cada 100 g. del ingrediente A y de 1 euros por cada 100 g del ingrediente B .

El menú a diseñar debería contener no más de 30 g de grasas y al menos 110 Kilocalorías por cada 100 g de alimento. Se pide determinar las proporciones de cada ingrediente a emplear en el menú de manera que su coste sea lo más reducido posible.

- a) Indíquese la expresión de las restricciones y la función objetivo.
- b) Representétese gráficamente la región delimitada por las restricciones.
- c) Calcúlese el porcentaje óptimo de cada ingrediente a incluir en el menú.

(Septiembre 2000 - Opción B)

2.2. Año 2001

Problema 2.2.1 (3 puntos) En un depósito se almacenan bidones de petróleo y de gasolina. Para poder atender la demanda se han de tener almacenados un mínimo de 10 bidones de petróleo y 20 de gasolina. Siempre debe haber más bidones de gasolina que de petróleo, siendo la capacidad del depósito de 200 bidones. Por razones comerciales, deben mantenerse en inventario al menos 50 bidones. El gasto de almacenaje de un bidón de petróleo es de 20 céntimos y el de uno de gasolina es de 30 céntimos. Se desea saber cuántos bidones de cada clase han de almacenarse para que el gasto de almacenaje sea mínimo.

- a) Exprésense la función objetivo y las restricciones del problema.

b) Representétese gráficamente la región factible y calcúlense los vértices de la misma.

c) Resuélvase el problema

(Junio 2001 - Opción B)

2.3. Año 2002

Problema 2.3.1 (3 puntos) Un fabricante de productos químicos vende fertilizantes, A y B , a razón de 40 y 20 euros el kilogramo, respectivamente. Su producción máxima es de una tonelada de cada fertilizante y su mínimo operativo es de 100 kilogramos de cada fertilizante. Si su producción total es de 1700 kilogramos, ¿cuál es la producción que maximiza sus ingresos? Calcular dichos ingresos máximos.

(Modelo 2002 - Opción A)

Problema 2.3.2 (3 puntos) Considerar el siguiente problema de programación lineal:

Minimizar $z = -3x - 2y$

Sujeto a

$$\begin{aligned} -2x + y &\leq 2 \\ x - 2y &\leq 2 \\ x \geq 0 \quad y &\geq 0 \end{aligned}$$

a) Mediante la resolución gráfica del problema, discutir si existen soluciones factibles y si existe solución óptima.

b) Si se añade la restricción:

$$x + y \geq 10$$

discutir si existe solución óptima y en caso afirmativo calcularla.

Problema 2.3.3 (3 puntos) Un proyecto de asfaltado puede llevarse a cabo por dos grupos diferentes de una misma empresa: $G1$ y $G2$. Se trata de asfaltar tres zonas: A , B y C . En una semana, el grupo $G1$ es capaz de asfaltar 3 unidades en la zona A , 2 en la zona B y 2 en la zona C . El grupo $G2$ es capaz de asfaltar semanalmente 2 unidades en la zona A , 3 en la zona B y 2 en la zona C . El coste semanal se estima en 33000 euros para $G1$ y en 35000 euros para $G2$. Se necesita asfaltar un mínimo de 6 unidades en la zona A , 12 en la zona B y 10 en la zona C . ¿Cuántas semanas deberá trabajar cada grupo para finalizar el proyecto con el mínimo coste?

(Junio 2002 - Opción B)

Problema 2.3.4 (3 puntos) Determinar los valores máximo y mínimo de la función $z = 3x + 4y$ sujeta a las restricciones:

$$\begin{cases} 3x + y \geq 3 \\ x + y \leq 5 \\ x \geq -2 \\ y \leq 10 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

(Septiembre 2002 - Opción B)

2.4. Año 2003

Problema 2.4.1 (3 puntos) Un vendedor quiere dar salida a 400 kg de garbanzos, 300 kg de lentejas y 250 kg de judías. Para ello hace dos tipos de paquetes. Los de tipo *A* contienen 2 kg de garbanzos, 2 kg de lentejas y 1 kg de judías y los de tipo *B* contienen 3 kg de garbanzos, 1 kg de lentejas y 2 kg de judías. El precio de venta de cada paquete es de 25 euros para los del tipo *A* y de 35 euros para los del tipo *B*. ¿Cuántos paquetes de cada tipo debe vender para obtener el máximo beneficio y a cuánto asciende éste?

(Junio 2003 - Opción B)

Problema 2.4.2 (3 puntos) Determinar los valores máximos y mínimos de la función $z = 5x + 3y$ sujeta a las restricciones

$$\begin{cases} 3x + y \geq 4 \\ x + y \leq 6 \\ 0 \leq x \leq 5 \\ 0 \leq y \leq 5 \end{cases}$$

(Septiembre 2003 - Opción B)

2.5. Año 2004

Problema 2.5.1 (3 puntos) Un centro dedicado a la enseñanza personalizada de idiomas tiene dos cursos, uno básico y otro avanzado, para los que dedica distintos recursos. Esta planificación hace que pueda atender entre 20 y 65 estudiantes del curso básico y entre 20 y 40 estudiantes del curso avanzado. El número máximo de estudiantes que en total puede atender es 100. Los beneficios que obtiene por cada estudiante en el curso básico se estiman en 145 euros y en 150 euros por cada estudiante del curso avanzado. Hallar qué número de estudiantes de cada curso proporciona el máximo beneficio.

(Modelo 2004 - Opción B)

Problema 2.5.2 (3 puntos) Un producto se compone de la mezcla de otros dos A y B . Se tienen 500kg de A y 500kg de B . En la mezcla, el peso de B debe ser menor o igual que 1,5 veces el de A . Para satisfacer la demanda, la producción debe ser mayor o igual a 600kg . Sabiendo que cada kg de A cuesta 5 euros y cada kg de B cuesta 4 euros, calcular los kg de A y B que deben emplearse para hacer una mezcla de coste mínimo, que cumpla los requisitos anteriores. Obtener dicho coste mínimo.
(Junio 2004 - Opción A)

Problema 2.5.3 (3 puntos) Un establecimiento de prendas deportivas tiene almacenados 1600 bañadores, 1000 gafas de baño y 800 gorros de baño. Se quiere incentivar la compra de estos productos mediante la oferta de dos tipos de lotes: el lote A , que produce un beneficio de 8 euros, formado por un bañador, un gorro y unas gafas, y el lote B que produce un beneficio de 10 euros y está formado por dos bañadores y unas gafas. Sabiendo que la publicidad de esta oferta tendrá un coste de 1500 euros a deducir de los beneficios, se pide calcular el número de lotes A y B que harán máximo el beneficio y a cuánto asciende éste.
(Septiembre 2004 - Opción B)

2.6. Año 2005

Problema 2.6.1 (3 puntos) Una compañía naviera dispone de dos barcos A y B para realizar un determinado crucero. El barco A debe hacer tantos viajes o más que el barco B , pero no puede sobrepasar 12 viajes. Entre los dos barcos deben hacer no menos de 6 viajes y no más de 20. La naviera obtiene un beneficio de 18000 euros por cada viaje del barco A y 12000 euros por cada viaje del B . Se desea que las ganancias sean máximas.

- Expresar la función objetivo.
- Describir mediante inecuaciones las restricciones del problema y representar gráficamente el recinto definido.
- Hallar el número de viajes que debe efectuar cada barco para obtener el máximo beneficio. Calcular dicho beneficio máximo.

(Modelo 2005 - Opción B)

Problema 2.6.2 (3 puntos) Un mayorista vende productos congelados que presenta en dos envases de dos tamaños: pequeño y grande. La capacidad de sus congeladores no le permite almacenar más de 1000 envases en total. En función de la demanda sabe que debe mantener un stock mínimo de 100 envases pequeños y 200 envases grandes. La demanda de envases grandes es igual o superior a la de envases pequeños. El coste por almacenaje es de 10

céntimos de euro para cada envase pequeño y de 20 céntimos de euro para cada envase grande. ¿Qué cantidad de cada tipo de envases proporciona el gasto mínimo de almacenaje?. Obtener dicho mínimo.
(Junio 2005 - Opción B)

Problema 2.6.3 (3 puntos) En una empresa de alimentación se dispone de 24 kg de harina de trigo y 15 kg de harina de maiz, que se utilizan para obtener dos tipos de preparados: A y B . La ración del preparado A contiene 200 gr de harina de trigo y 300 gr de harina de maiz, con 600 cal de valor energético. La ración del preparado B contiene 200 gr de harina de trigo y 100 gr de harina de maiz, con 400 cal de valor energético. ¿Cuántas raciones de cada tipo hay que preparar para obtener el máximo rendimiento energético total? Obtener el rendimiento máximo.
(Septiembre 2005 - Opción A)

2.7. Año 2006

Problema 2.7.1 (3 puntos) Un taller dedicado a la confección de prendas de punto fabrica dos tipos de prendas: A y B . Para la confección de la prenda de tipo A se necesitan 30 minutos de trabajo manual y 45 minutos de máquina. Para la de tipo B , 60 minutos de trabajo manual y 20 minutos de máquina. El taller dispone al mes como máximo de 85 horas para el trabajo manual y de 75 horas para el trabajo de máquina y debe confeccionar al menos 100 prendas. Si los beneficios son de 20 euros por cada prenda de tipo A y de 17 euros por cada prenda de tipo B , ¿cuántas prendas de cada tipo debe fabricar al mes, para obtener el máximo beneficio y a cuánto asciende éste?
(Modelo 2006 - Opción B)

Problema 2.7.2 (3 puntos) Una papelería quiere liquidar hasta 78 kg de papel reciclado y hasta 138 kg de papel normal. Para ello hace dos tipos de lotes, A y B . Los lotes A están formados por 1 kg de papel reciclado y 3 kg de papel normal, y los lotes B por 2 kg de papel de cada clase. El precio de venta de cada lote A es de 0,9 euros y el de cada lote B es de 1 euro. ¿Cuántos lotes A y B debe vender para maximizar sus ingresos? ¿A cuánto ascienden estos ingresos máximos?.
(Junio 2006 - Opción A)

Problema 2.7.3 (Puntuación máxima: 3 puntos)

Una empresa fabrica láminas de aluminio de dos grosores, finas y gruesas, y dispone cada mes de 400 kg de aluminio y 450 horas de trabajo para fabricarlas. Cada m^2 de lámina fina necesita 5 kg de aluminio y 10 horas de trabajo, y deja una ganancia de 45 euros. Cada m^2 de lámina gruesa necesita

20 kg y 15 horas de trabajo, y deja una ganancia de 80 euros. ¿Cuántos m^2 de cada lámina debe fabricar la empresa al mes para que la ganancia sea máxima, y a cuánto asciende ésta?
(Septiembre 2006 - Opción A)

2.8. Año 2007

Problema 2.8.1 (3 puntos) Una empresa de instalaciones dispone de 195 kg de cobre, 20 kg de titánio y 14 kg de aluminio. Para fabricar 100 metros de cable de tipo A se necesitan 10 kg de cobre, 2 de titánio y 1 de aluminio, mientras que para fabricar 100 metros de cable de tipo B se necesitan 15 kg de cobre, 1 de titánio y 1 de aluminio. El beneficio que se obtiene por 100 metros de tipo A es de 1500 euros, y por 100 metros de tipo B , 1000 euros.

Calcular los metros de cable de cada tipo que hay que fabricar para maximizar el beneficio de la empresa. Obtener dicho beneficio.
(Junio 2007 - Opción B)

Problema 2.8.2 (3 puntos) Una aerolínea quiere optimizar el número de filas de clase preferente y de clase turista en un avión. La longitud útil del avión para instalar las filas de asientos es de 104 m, necesitándose 2 m para instalar una fila de clase preferente y 1,5 m para las de clase turista. La aerolínea precisa instalar al menos 3 filas de clase preferente y que las filas de clase turista sean como mínimo el triple que las de preferente. Los beneficios por fila de clase turista son de 152 euros y de 206 euros para la clase preferente.

¿Cuántas filas de clase preferente y cuántas de clase turista se deben instalar para obtener el beneficio máximo?
(Septiembre 2007 - Opción B)

2.9. Año 2008

Problema 2.9.1 (3 puntos)

- a) Representar la región del plano definida por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$\begin{cases} -x + y \leq 60 \\ x + y \geq -40 \\ 11x + 3y \leq 40 \end{cases}$$

- b) Maximizar la función $f(x, y) = 10x - y$ en la región obtenida.
c) Minimizar la función $g(x, y) = x - 10y$.

(Modelo 2008 - Opción B)

Problema 2.9.2 (3 puntos) Un distribuidor de aceite de oliva compra la materia prima a dos almazaras, A y B . Las almazaras A y B venden el aceite a 2000 y 3000 euros por tonelada, respectivamente. Cada almazara le vende un mínimo de 2 toneladas y un máximo de 7 y para atender a su demanda, el distribuidor debe comprar en total un mínimo de 6 toneladas. El distribuidor debe comprar como máximo a la almazara A el doble de aceite que a la almazara B . ¿Qué cantidad de aceite debe comprar el distribuidor a cada almazara para obtener el mínimo coste? Determínese dicho coste mínimo.

(Junio 2008 - Opción B)

Problema 2.9.3 (3 puntos) Se desea invertir una cantidad de dinero menor o igual que 125000 euros, distribuidos entre acciones del tipo A y del tipo B . Las acciones del tipo A garantizan una ganancia del 10% anual, siendo obligatorio invertir en ellas un mínimo de 30000 euros y un máximo de 81000 euros. Las del tipo B garantizan una ganancia del 5% anual, siendo obligatorio invertir en ellas un mínimo de 25000 euros. La cantidad invertida en acciones del tipo B no puede superar el triple de la cantidad invertida en acciones del tipo A . ¿Cuál debe ser la distribución de la inversión para maximizar la ganancia anual? Determínese dicha ganancia máxima.

(Septiembre 2008 - Opción B)

2.10. Año 2009

Problema 2.10.1 (3 puntos) Una refinería utiliza dos tipos de petróleo, A y B , que compra a un precio de 350 euros y 400 euros por tonelada, respectivamente. Por cada tonelada de tipo A que refina, obtiene 0,10 toneladas de gasolina y 0,35 toneladas de fuel-oil. Por cada tonelada de tipo B que refina, obtiene 0,05 toneladas de gasolina y 0,55 toneladas de fuel-oil. Para cubrir sus necesidades necesita obtener al menos 10 toneladas de gasolina y al menos 50 toneladas de fuel-oil. Por cuestiones de capacidad, no puede comprar más de 100 toneladas de cada tipo de petróleo. ¿Cuántas toneladas de petróleo de cada tipo debe comprar la refinería para cubrir sus necesidades a mínimo coste? Determinar dicho coste mínimo.

(Junio 2009 - Opción B)

Problema 2.10.2 (3 puntos) Una carpintería vende paneles de contrachapado de dos tipos A y B . Cada m^2 de panel del tipo A requiere 0,3 horas de trabajo para su fabricación y 0,2 horas para su barnizado, proporcionando un beneficio de 4 euros. Cada m^2 de panel del tipo B requiere 0,2 horas de trabajo para su fabricación y 0,2 horas para su barnizado, proporcionando su venta un beneficio de 3 euros. Sabiendo que en una semana se trabaja

un máximo de 240 horas de taller de fabricación y 200 horas en el taller de barnizado, calcular los m^2 de cada tipo de panel que debe vender semanalmente la carpintería para obtener el máximo beneficio. Calcular dicho beneficio máximo.

(Septiembre 2009 - Opción A)

2.11. Año 2010

Problema 2.11.1 (3 puntos) Una empresa de instalaciones dispone de 195 kg de cobre, 20 kg de titanio y 14 de aluminio. Para fabricar 100 metros de cable de tipo A se necesitan 10 kg de cobre, 2 kg de titanio y 1 kg de aluminio. Para fabricar 100 metros de cable de tipo B se necesitan 15 kg de cobre, 1 kg de titanio y 1 kg de aluminio. El beneficio que obtiene la empresa por cada 100 metros de cable de tipo A fabricados es igual a 1500 euros, y por cada 100 metros de cable de tipo B es igual a 1000 euros. Calcúlese los metros de cable de cada tipo que han de fabricarse para maximizar el beneficio y determínese dicho beneficio máximo.

(Modelo 2010 - Opción B)

Problema 2.11.2 (3 puntos) Un club de fútbol dispone de un máximo de 2 millones de euros para fichajes de futbolistas españoles y extranjeros. Se estima que el importe total de las camisetas vendidas por el club con el nombre de futbolistas españoles es igual al 10% de la cantidad total invertida por el club en fichajes españoles, mientras que el importe total de las camisetas vendidas con el nombre de futbolistas extranjeros es igual al 15% de la cantidad total invertida por el club en fichajes extranjeros. Los estatutos del club limitan a un máximo de 800000 euros la inversión total en jugadores extranjeros y exigen que la cantidad total invertida en fichajes de españoles ha de ser como mínimo de 500000 euros. Además, la cantidad total invertida en fichajes de españoles ha de ser mayor o igual que la invertida en fichajes extranjeros. ¿Qué cantidad debe invertir el club en cada tipo de fichajes para que el importe de las camisetas vendidas sea máximo? Calcúlese dicho importe máximo. Justifíquese.

(Junio 2010 - Opción A)

Problema 2.11.3 (3 puntos) Un pintor necesita pintura para pintar como mínimo una superficie de $480 m^2$. Puede comprar la pintura a dos proveedores, A y B . El proveedor A le ofrece una pintura con un rendimiento de $6 m^2$ por kg y un precio de 1 euro por kg. La pintura del proveedor B tiene un precio de 1,2 euros por kg y un rendimiento de $8 m^2$ por kg. Ningún proveedor le puede proporcionar más de 75 kg y el presupuesto máximo del pintor es de 120 euros. Calcúlese la cantidad de pintura que el pintor tiene que comprar a cada proveedor para obtener el mínimo coste. Calcúlese dicho

coste mínimo.
(Septiembre 2010 - Opción B)

2.12. Año 2011

Problema 2.12.1 (3 puntos). Se considera la región S acotada plana definida por las cinco condiciones siguientes:

$$x + 2y \leq 4; \quad x - 2y \leq 4; \quad 2x - 3y \geq -6; \quad 2x + 3y \geq -6; \quad x \leq 2$$

- Dibújese S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- Calcúlense los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = 2x + y$ en la región S y especifíquense los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Septiembre 2011 - Opción A)

2.13. Año 2012

Problema 2.13.1 (3 puntos) Una compañía aérea oferta hasta un máximo de 60 plazas en sus vuelos diarios entre Madrid y Lisboa. Las plazas de clase turista se ofrecen a 40 euros, mientras que las de primera clase tienen un precio de venta de 75 euros. Por normativa internacional, el número de plazas ofertadas de primera clase debe ser inferior o igual al doble de las plazas de clase turista y superior o igual a la mitad de las plazas de dicha clase turista. Además, por motivos de estrategia empresarial, la compañía tiene que ofrecer como mínimo 10 plazas de clase turista.

¿Qué número de plazas de cada clase se deben ofertar diariamente con el objetivo de maximizar los ingresos de la aerolínea? Determínese dicho ingreso máximo.

(Junio 2012(coincidente) - Opción B)

Problema 2.13.2 (3 puntos) Un pintor dispone de dos tipos de pintura para realizar su trabajo. El primer tipo de pintura tiene un rendimiento de 3 m^2 por litro, con un coste de 1 euro por litro. El segundo tipo de pintura tiene un rendimiento de 4 m^2 por litro, con un coste de 1,2 euros por litro. Con ambos tipos de pintura se puede pintar a un ritmo de 1 litro cada 10 minutos. El pintor dispone de un presupuesto de 480 euros y no puede pintar durante más de 75 horas. Además, debe utilizar al menos 120 litros de cada tipo de pintura. Determínese la cantidad de pintura que debe utilizar de cada tipo si su objetivo es pintar la máxima superficie posible. Indíquese cuál es esa superficie máxima.

(Septiembre 2012 - Opción A)

2.14. Año 2013

Problema 2.14.1 (2 puntos)

- a) Determinéense los valores de a y b para que la función objetivo $F(x, y) = 3x + y$ alcance su valor máximo en el punto $(6, 3)$ de la región factible definida por

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + ay \leq 3 \\ 2x + y \leq b \end{cases}$$

- b) Representése la región factible para esos valores y calcúlese las coordenadas de todos sus vértices.

(Modelo 2013 - Opción B)

Problema 2.14.2 (2 puntos) Se desea maximizar la función $f(x, y) = 64, 8x + 76, 5y$ sujeta a las siguientes restricciones:

$$6x + 5y \leq 700, \quad 2x + 3y \leq 300, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

- a) Representése gráficamente la región de soluciones factibles y calcúlese las coordenadas de sus vértices.
- b) Determinése el valor máximo de f sobre la región, indicando el punto donde se alcanza dicho máximo.

(Junio 2013 - Opción A)

Problema 2.14.3 (2 puntos) Sea C la región del plano delimitada por el sistema de inecuaciones

$$S : \begin{cases} 2x - y \geq 1 \\ x + y \geq 5 \\ 7x + y \leq 35 \end{cases}$$

- a) Representése la región C y calcúlese las coordenadas de sus vértices.
- b) Calcúlese los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x, y) = 3x - 2y$ sobre la región C , determinando los puntos donde se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Junio 2013 (coincidente)- Opción B)

Problema 2.14.4 (2 puntos) Sea C la región del plano delimitada por el sistema de inecuaciones

$$\begin{cases} x + 3y \geq 3 \\ 2x - y \leq 4 \\ 2x + y \leq 24 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

- a) Representétese la región C y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- b) Determínese el punto de C donde la función $f(x, y) = 3x + y$ alcanza su valor máximo. Calcúlese dicho valor.

(Septiembre 2013 - Opción A)

2.15. Año 2014

Problema 2.15.1 (2 puntos) Un astillero recibe un encargo para reparar barcos de la flota de un armador, compuesta por pesqueros de 500 toneladas y yates de 100 toneladas. Cada pesquero se tarda en reparar 100 horas y cada yate 50 horas. El astillero dispone de 1600 horas para hacer las reparaciones. Por política de empresa, el astillero no acepta encargos de más de 12 pesqueros ni más de 16 yates. Las reparaciones se pagan a 100 euros la tonelada, independientemente del tipo de barco. ¿Cuántos barcos de cada clase debe reparar el astillero para maximizar el ingreso con este encargo? ¿Cuál es dicho ingreso máximo?

(Modelo 2014 - Opción A)

Solución:

Problema 2.15.2 (2 puntos) Se consideran la función $f(x, y) = 5x - 2y$ y la región del plano S definida por el siguiente conjunto de restricciones:

$$x - 2y \leq 0, \quad x + y \leq 6, \quad x \geq 0, \quad y \leq 3$$

- a) Representétese la región S .
- b) Calcúlense las coordenadas de los vértices de la región S y obténganse los valores máximo y mínimo de la función f en S indicando los puntos donde se alcanzan.

(Junio 2014 - Opción A)

Problema 2.15.3 (2 puntos) Sea S la región del plano definida por:

$$x - 2y < 0; \quad x - y < 1; \quad x + y < 5; \quad x > 0; \quad y > 0$$

- a) Representétese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- b) Obténganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = x - y$ en la región S indicando los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 2.15.4 (2 puntos) Sea S la región del plano definida por

$$y \geq 2x - 4; \quad y \leq x - 1; \quad 2y \geq x; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0$$

- Representétese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- Obtéganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = x - 3y$ en S indicando los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Septiembre 2014 - Opción B)

Problema 2.15.5 (2 puntos) Una industria química elabora plásticos de dos calidades diferentes. Para ello tiene 2 máquinas, A y B . Es necesario que fabrique un mínimo de 20 toneladas de plástico superior y 13 de plástico medio. Cada hora que trabaja la máquina A , fabrica 7 toneladas de plástico superior y 2 de plástico medio, mientras que la máquina B produce 2 y 3 toneladas, respectivamente. Además, la máquina A no puede trabajar más de 9 horas, ni más de 10 horas la máquina B . El coste de funcionamiento de las máquinas es de 800 euros/hora para A y de 600 euros/hora para B . Calcúlese cuántas horas debe funcionar cada máquina para que el coste total de funcionamiento sea mínimo y cuál es ese coste mínimo.

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción A)

2.16. Año 2015

Problema 2.16.1 (2 puntos) Una empresa láctea se plantea la producción de dos nuevas bebidas A y B . Producir un litro de la bebida A cuesta 2 euros, mientras que producir un litro de bebida B cuesta 0,5 euros. Para realizar el lanzamiento comercial se necesitan al menos 6 millones de litros de bebida, aunque del tipo B no podrán producirse (por limitaciones técnicas) más de 5 millones y debido al coste de producción no es posible elaborar más de 8 millones de litros en total de ambas bebidas. Además, se desea producir una cantidad de bebida B mayor o igual que la de bebida A . ¿Cuántos litros habrá que producir de cada tipo de bebida para que el coste de producción sea mínimo? Calcúlese dicho coste. Justifíquense las respuestas.

(Modelo 2015 - Opción A)

Problema 2.16.2 (2 puntos) Una fábrica de piensos para animales produce diariamente como mucho seis toneladas de pienso del tipo A y como máximo cuatro toneladas de pienso del tipo B . Además, la producción diaria de pienso del tipo B no puede superar el doble de la del tipo A y, por último, el doble de la fabricación de pienso del tipo A sumada con la del tipo B debe

ser como poco cuatro toneladas diarias. Teniendo en cuenta que el coste de fabricación de una tonelada de pienso del tipo A es de 1000 euros y el de una tonelada del tipo B de 2000 euros, ¿cuál es la producción diaria para que la fábrica cumpla con sus obligaciones con un coste mínimo? Calcúlese dicho coste diario mínimo.

(Junio 2015 - Opción A)

Problema 2.16.3 (2 puntos) Un banco oferta dos productos financieros, A y B . El banco garantiza para el producto A un beneficio anual del 5 % de la cantidad invertida, y para el producto B un beneficio del 2 % anual de la cantidad invertida. Una persona desea invertir en ambos productos a lo sumo 10.000 euros, con la condición de que la cantidad invertida en el producto A no supere el triple de la cantidad invertida en el producto B y que la inversión en el producto B sea de 6.000 euros como máximo. Determinése qué cantidad debe invertir en cada producto para obtener, al cabo de un año, un beneficio máximo y obténgase este beneficio máximo.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 2.16.4 (2 puntos) Un distribuidor de aceite acude a una almazara para comprar dos tipos de aceite, A y B . La cantidad máxima que puede comprar es de 12.000 litros en total. El aceite de tipo A cuesta 3 euros/litro y el de tipo B cuesta 2 euros/litro. Necesita adquirir al menos 2.000 litros de cada tipo de aceite. Por otra parte, el coste total por compra de aceite no debe ser superior a 30.000 euros. El beneficio que se conseguirá con la venta del aceite será de un 25 % sobre el precio que ha pagado por el aceite de tipo A y de un 30 % sobre el precio que ha pagado por el aceite de tipo B . ¿Cuántos litros de cada tipo de aceite se deberían adquirir para maximizar el beneficio? Obténgase el valor del beneficio máximo.

(Septiembre 2015 - Opción A)

Problema 2.16.5 (2 puntos) Sea S la región del plano definida por:

$$y + 2x \geq 7; \quad y - 2x \geq -1; \quad y \leq 5;$$

- Representése la región S y calcúlese las coordenadas de sus vértices.
- Obténganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = -5x - 5y$ en la región S indicando los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción A)

2.17. Año 2016

Problema 2.17.1 (2 puntos) Sea S la región del plano definida por:

$$y + x \leq 5; \quad y - x \leq 3; \quad \frac{1}{2}x - y \leq -2$$

- a) Representétese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- b) Obténganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = 2x + y$ en la región S indicando los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Junio 2016 - Opción A)

Problema 2.17.2 (2 puntos) Sea S la región del plano definida por:

$$y + x \leq 5; \quad 2x - y \geq -2; \quad x \geq 0; \quad y \geq 1$$

- a) Representétese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- b) Obténganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = 2x - 3y$ en la región S indicando los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Junio 2016 - Opción B (Coincidentes))

Problema 2.17.3 (2 puntos) Sea S la región del plano definida por:

$$2x - y > 1; \quad 2x - 3y < 6; \quad x + 2y > 3; \quad x + y < 8; \quad y < 3$$

- a) Representétese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.
- b) Obténganse los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = 2x + y$ en la región S indicando los puntos de S en los cuales se alcanzan dichos valores máximo y mínimo.

(Septiembre 2016 - Opción A)

www.musat.net

Capítulo 3

Análisis

3.1. Año 2000

Problema 3.1.1 (3 puntos)

- Calcúlense p y q de modo que la curva $y = x^2 + px + q$ contenga al punto $(-2, 1)$ y presente un mínimo en $x = -3$.
- Hállese el área del recinto acotado delimitado por la curva $y = x^2 + 4x + 5$ y la recta $y = 5$.

(Modelo 2000 - Opción A)

Problema 3.1.2 (3 puntos) El número de individuos, en millones, de una población, viene dado por la función:

$$P(t) = \frac{15 + t^2}{(t + 1)^2}$$

donde t se mide en años transcurridos desde $t = 0$.

Calcúlese:

- La población inicial.
- El año en que se alcanzará la mínima población. ¿Cuál será el tamaño de ésta?
- ¿Cuál será el tamaño de la población a largo plazo?

(Modelo 2000 - Opción B)

Problema 3.1.3 (3 puntos) Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{x-1} & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{3x^2-2x}{x+2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- a) Estúdiese si $f(x)$ es continua en $x = 2$.
- b) Calcúlese la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en el punto $x = 3$.
- c) Calcúlense sus asíntotas oblicuas.

(Junio 2000 - Opción A)

Problema 3.1.4 (3 puntos) Sea la función dependiente de los parámetros a y b .

$$f(x) = \begin{cases} -2x - a & \text{si } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ bx - 5 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- a) Halla los valores de a y b para que la función sea continua en el conjunto R de los números reales.
- b) Representa gráficamente para los valores $a = 0$ y $b = 3$.
- c) Para los valores $a = 0$ y $b = 3$, halla el área de la región plana acotada limitada por la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

(Junio 2000 - Opción B)

Problema 3.1.5 (3 puntos) Dada la función definida en los números reales salvo en $x = 0$

$$f(x) = 3 - x - \frac{2}{x}$$

Calcular

- a) Las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos.
- b) El área de la región plana acotada limitada por la gráfica de $f(x)$ y el semieje OX .

(Septiembre 2000 - Opción A)

Problema 3.1.6 (3 puntos) Dada la función

$$s(t) = \frac{340 + 330t - 10t^2}{t + 2}$$

definida en los reales, salvo en $t = -2$

- a) El valor positivo de t en el que se hace cero la función
- b) El valor positivo de t en el que $s(t)$ se hace máximo.
- c) Las asíntotas de $s(t)$.

(Septiembre 2000 - Opción B)

3.2. Año 2001

Problema 3.2.1 (3 puntos) El número total de bacterias (en miles) presentes en un cultivo después de t horas viene dado por $N(t) = 2t(t - 10)^2 + 50$.

- Calcúlense la función derivada $N'(t)$.
- Durante las 10 primeras horas, ¿en qué instantes se alcanzan la población máxima y mínima?
- Esbócese la gráfica de $N(t)$ en el intervalo $[0, 10]$.

(Modelo 2001 - Opción A)

Problema 3.2.2 (3 puntos) La gráfica de la función $f(x) = ax^3 + bx + c$ satisface las siguientes propiedades:

- Pasa por $(0, 0)$
 - Tiene mínimo local en $(1, -1)$
- Obtégase el valor de los coeficientes a , b y c .
 - Hállese el área de la región plana acotada limitada por la gráfica de $g(x) = x^3 - 4x$, el eje de abscisas y las rectas $x = 3$ y $x = 4$.

(Modelo 2001 - Opción B)

Problema 3.2.3 (3 puntos) Una empresa fabrica cajas de latón sin tapa de volumen 500 cm^3 , para almacenar un líquido colorante. Las cajas tienen base cuadrada. Halléense la altura y el lado de la base de cada caja para que la cantidad de latón empleada en fabricarlas sea la mínima posible.

(Junio 2001 - Opción A)

Problema 3.2.4 (3 puntos) Dada la función

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$$

- Determinéense sus máximos y mínimos relativos.
- Calcúlense sus puntos de inflexión.
- Esbócese su gráfica.

(Junio 2001 - Opción B)

Problema 3.2.5 (3 puntos) Sean las funciones $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = -x^2 + c$.

- a) Determínese a , b y c , sabiendo que las gráficas de ambas funciones se cortan en los puntos $(-2, -3)$ y $(1, 0)$.
- b) Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $g(x)$ en el punto $(-2, -3)$.
- c) Calcúlese el área de la región limitada por las gráficas de $f(x)$ y $g(x)$.

(Septiembre 2001 - Opción A)

Problema 3.2.6 (3 puntos) Sea la función

$$f(x) = 2x^2 - \frac{1}{3}x^3$$

Calcúlese

- a) Los intervalos donde es creciente y decreciente.
- b) Las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos.
- c) El valor de x para el que es máxima la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$.

(Septiembre 2001 - Opción B)

3.3. Año 2002

Problema 3.3.1 (3 puntos)

- a) Dibujar el recinto limitado por las gráficas de las siguientes curvas:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2 \\ g(x) &= x + 2 \\ \text{siendo } 0 &\leq x \leq 2 \end{aligned}$$

- b) Calcular el área de dicho recinto anterior.

(Modelo 2002 - Opción B)

Problema 3.3.2 (3 puntos)

- a) Hallar las coordenadas del mínimo de la curva $y = x^2 - 4x - 5$.
- b) Calcular el área del triángulo limitado por el eje OX y las tangentes a la curva dada en los puntos de intersección de dicha curva con el eje OX .

(Junio 2002 - Opción A)

Problema 3.3.3 (3 puntos) Se considera la curva de ecuación

$$y = x^3 - 4x$$

- Hallar las coordenadas de sus puntos de intersección con los ejes coordenados y de sus máximos y mínimos relativos, si existen.
- Representar gráficamente la curva.
- Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la curva y el eje OX .

(Junio 2002 - Opción B)

Problema 3.3.4 (3 puntos) Para cada valor de a se considera la función

$$f(x) = \frac{3x^2 - ax}{x + 2}$$

- Calcular el valor de a para que $f(x)$ tenga un mínimo relativo en $x = 2$.
- Hallar las asíntotas de la curva $y = f(x)$ para $a = 3$

(Septiembre 2002 - Opción A)

Problema 3.3.5 (3 puntos) Calcular el valor de $a > 0$ en los siguientes casos:

a) $\int_0^3 \frac{1}{x+1} dx = a$

b) $\int_0^a \frac{1}{x+1} dx = 3$

c) $\int_0^3 \frac{1}{x+a} dx = 5$

(Septiembre 2002 - Opción B)

3.4. Año 2003

Problema 3.4.1 (3 puntos) Sean las funciones $f(x) = x^2 - 9$ y $g(x) = x^2 - x - 6$.

Calcular:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)}$

- b) Los extremos relativos de $g(x)$, si existen.

- c) El área del recinto limitado por la gráfica de la función $f(x)$, el eje OX y las rectas $x = 3$, $x = 6$.

(Junio 2003 - Opción A)

Problema 3.4.2 (3 puntos) Dada la función $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$

- Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Calcular sus asíntotas.
- Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = 0$.

(Junio 2003 - Opción B)

Problema 3.4.3 (3 puntos) Se considera la función $f(x) = xe^{x^2}$.

- Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$.
- Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de $f(x)$ para $x \geq 0$, el eje OX y la recta $x = 2$.

(Septiembre 2003 - Opción A)

Problema 3.4.4 (3 puntos) Sea la función $f(x) = \frac{-x^2 + 1}{2x^2 + 2x - 12}$

Se pide:

- Especificar su dominio de definición.
- Estudiar su continuidad.
- Calcular sus asíntotas si las hubiera.

(Septiembre 2003 - Opción B)

3.5. Año 2004

Problema 3.5.1 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

- Hallar las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos.
- Determinar los intervalos de concavidad y convexidad.
- Esbozar la gráfica de $f(x)$.

(Modelo 2004 - Opción A)

Problema 3.5.2 (3 puntos) Para cada valor de a se considera la función

$$f(x) = 2x + ax^2 - 4 \ln x$$

- Calcular el valor del parámetro real a sabiendo que la función tiene un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 1$. Clasificar el extremo.
- Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento para $a = 3$.
- Hallar las asíntotas.

Observación: La notación \ln representa logaritmo neperiano.
(Modelo 2004 - Opción B)

Problema 3.5.3 (3 puntos) Calcular la integral definida

$$\int_{-1}^1 (|x| + x + 1) dx$$

Nota.- La notación $|x|$ representa el valor absoluto de x .
(Junio 2004 - Opción A)

Problema 3.5.4 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}}$$

- Determinar su dominio de definición.
- Obtener sus asíntotas.

(Junio 2004 - Opción B)

Problema 3.5.5 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^3}{a} - ax^2 + 5x + 10, \quad a \neq 0$$

- Obtener los valores de a para los cuales la función $f(x)$ tiene un máximo en $x = 1$.
- Calcular los extremos relativos de $f(x)$ para $a = 3$ y representar la función.

(Septiembre 2004 - Opción A)

Problema 3.5.6 (3 puntos) Sean las funciones

$$f(x) = x^2 - 2x - 8; \quad g(x) = -\frac{x^2}{2} + x + 4$$

a) Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{g(x)}$$

b) Calcular el recinto acotado limitado por las curvas $f(x)$ y $g(x)$.

(Septiembre 2004 - Opción B)

3.6. Año 2005

Problema 3.6.1 (3 puntos) Sea la función: $f(x) = x^3 - 3x$

a) Calcular sus extremos y sus puntos de inflexión.

b) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de $f(x)$, el eje OX y las rectas verticales $x = -1$, $x = \frac{1}{2}$.

(Modelo 2005 - Opción A)

Problema 3.6.2 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Estudiar la continuidad de $f(x)$ en $x = 1$.

b) Esbozar su gráfica.

c) Hallar la ecuación de la recta tangente a dicha gráfica en $x = 1$.

(Modelo 2005 - Opción B)

Problema 3.6.3 (3 puntos) La función:

$$B(x) = \frac{-x^2 + 9x - 16}{x}$$

representa, en miles de euros, el beneficio neto de un proceso de venta, siendo x el número de artículos vendidos. Calcular el número de artículos que deben venderse para obtener el beneficio máximo y determinar dicho beneficio máximo.

(Junio 2005 - Opción A)

Problema 3.6.4 (3 puntos)

- a) Hallar la ecuación de una recta tangente a la gráfica de $f(x) = e^{2-x}$ en el punto donde ésta corta al eje de ordenadas.
- b) Calcular el área del recinto limitado por la gráfica de la función $f(x) = x^2 - 4x$, el eje OX y las rectas $x = -1$, $x = 4$.

(Junio 2005 - Opción B)

Problema 3.6.5 (3 puntos) Se considera la curva de ecuación $y = \frac{x^3}{x^2 + 1}$. Se pide:

- a) Hallar la ecuación de la recta tangente a dicha curva en el punto de abscisa $x = 1$.
- b) Hallar las asíntotas de la curva.

(Septiembre 2005 - Opción A)

Problema 3.6.6 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9}$$

- a) Hallar sus asíntotas.
- b) Calcular sus máximos y sus mínimos relativos, si existen.

(Septiembre 2005 - Opción B)

3.7. Año 2006

Problema 3.7.1 (3 puntos) Calcular el área del recinto acotado limitado por la gráfica de la función

$$f(x) = x^3 + 5x^2 + 2x - 8$$

y el eje OX .

(Modelo 2006 - Opción A)

Problema 3.7.2 (3 puntos) Calcular el valor de $a > 0$ para que el área de la región plana acotada limitada por las gráficas de las curvas $y = x^3$, $y = ax$, sea igual a 4.

(Modelo 2006 - Opción B)

Problema 3.7.3 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = x^3 - 9x$$

Se pide:

- a) Calcular sus máximos y mínimos relativos, si existen.
- b) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX .

(Junio 2006 - Opción A)

Problema 3.7.4 (3 puntos) Se considera la curva de ecuación cartesiana:

$$y = x^2 + 8x$$

Se pide:

- a) Calcular las coordenadas del punto en el que la recta tangente a la curva es paralela a la recta

$$y = 2x$$

- b) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por las gráficas de la curva dada y de la recta de ecuación cartesiana

$$y = x + 8$$

(Junio 2006 - Opción B)

Problema 3.7.5 (Puntuación máxima: 3 puntos)

Dada la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 - 16}{x^2 - 4}$$

Se pide:

- a) Encontrar las asíntotas de la función.
- b) Especificar el signo de la función en las distintas regiones en las que está definida.

(Septiembre 2006 - Opción A)

Problema 3.7.6 (Puntuación máxima: 3 puntos)

Representar gráficamente la región acotada limitada por las gráficas de las funciones

$$f(x) = 9 - x^2, \quad g(x) = 3 + x$$

y obtener su área.

(Septiembre 2006 - Opción B)

3.8. Año 2007

Problema 3.8.1 (3 puntos) Dada la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{(x-3)^2}{x+3}$$

- Determinar las asíntotas de la función.
- Calcular sus máximos y sus mínimos y determinar sus intervalos de crecimiento.

(Junio 2007 - Opción A)

Problema 3.8.2 (3 puntos) Representar gráficamente la región acotada limitada por las gráficas de las funciones

$$f(x) = \frac{5}{4}x^2, \quad g(x) = \frac{1}{2}(5x+20), \quad h(x) = \frac{1}{2}(-5x+20)$$

y obtener su área.

(Junio 2007 - Opción B)

Problema 3.8.3 (3 puntos) Dada la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 3x + 2}$$

- Especificar el dominio de definición.
- Estudiar su continuidad.
- Calcular sus asíntotas si las hubiera.

(Septiembre 2007 - Opción A)

Problema 3.8.4 (3 puntos) La gráfica de la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ satisface las siguientes propiedades:

- Pasa por el punto $(0, 0)$.
- Tiene un máximo local en el punto $(1, 2)$.

Se pide:

- Obtener el valor de los coeficientes a , b y c .
- Hallar el área de la región acotada del plano limitada por la gráfica de la función $g(x) = -x^3 + 3x$, el eje OX y la recta $x = 1$.

(Septiembre 2007 - Opción B)

3.9. Año 2008

Problema 3.9.1 (3 puntos) Dada la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 4}$$

- Calcular sus asíntotas y esbozar su gráfica.
- Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 0$.

(Modelo 2008 - Opción A)

Problema 3.9.2 (3 puntos) Dada la función real de variable real definida por $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, se pide determinar:

- Los puntos en los que la gráfica de f corta a los ejes de coordenadas.
- Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .
- El área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de la función y el eje OX .

(Modelo 2008 - Opción B)

Problema 3.9.3 (3 puntos) Cálculase el área de la región plana acotada limitada por las gráficas de las funciones reales de variable real

$$f(x) = x^2 - x, \quad g(x) = 1 - x^2$$

(Junio 2008 - Opción A)

Problema 3.9.4 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x}, \quad x \neq 0$$

- Determinense las asíntotas de f .
- Calcúlense sus máximos y mínimos relativos y determinense sus intervalos de crecimiento.
- Calcúlase la integral definida $\int_1^2 f(x) dx$.

(Junio 2008 - Opción B)

Problema 3.9.5 (3 puntos) Se desea fabricar un acuario con base cuadrada y sin tapa, de capacidad 500 dm^3 . La base y las paredes del acuario han de estar realizadas en cristal. ¿Cuáles deben ser sus medidas para minimizar la superficie total del cristal empleado?

(Septiembre 2008 - Opción A)

Problema 3.9.6 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 4}, \quad x \neq 2$$

- Determinense las asíntotas de f .
- Calcúlense sus máximos y mínimos relativos y determinense sus intervalos de crecimiento.
- Calcúlese la integral definida $\int_3^5 (x^2 - 4)f(x) dx$.

(Septiembre 2008 - Opción B)

3.10. Año 2009

Problema 3.10.1 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx; \quad a, b \in \mathbb{R}$$

- ¿Qué valores deben tomar a y b para que f tenga un máximo relativo en el punto $P(1, 4)$?
- Para $a = -2$, $b = -8$, determinense los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes de coordenadas y determinense los puntos de inflexión de dicha gráfica.
- Para $a = -2$, $b = -8$, calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX .

(Modelo 2009 - Opción A)

Problema 3.10.2 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 2 \\ x + a & \text{si } 2 \leq x \leq 5 \\ -x^2 + 5x + b & \text{si } x > 5 \end{cases} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

- Calcúlense los valores de a y b para que la f se continúe en $x = 2$ y en $x = 5$.
- Para $a = 1$ y $b = 6$, calcúlense las derivadas $f'(1)$ y $f'(7)$.
- Para $a = 1$ y $b = 6$, calcúlese la integral definida $\int_3^6 f(x) dx$

(Modelo 2009 - Opción B)

Problema 3.10.3 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = (x^2 - 1)^2$$

- Determinense los extremos relativos de f .
- Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 3$.
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por las gráficas de f y el eje OX .

(Junio 2009 - Opción A)

Problema 3.10.4 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x - a}$$

- Determinense las asíntotas de f , especificando los valores del parámetro real a para los cuales f tiene una asíntota vertical, dos asíntotas verticales, o bien no tiene asíntotas verticales.
- Para $a = -1$, calcúlese los valores reales de b para los cuales se verifica que $\int_0^b f(x) dx = 0$

(Junio 2009 - Opción B)

Problema 3.10.5 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$\begin{cases} 2x + 24 & \text{si } x \leq -3 \\ x^2 + 9 & \text{si } -3 < x \leq 2 \\ -x + 15 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- Representétese gráficamente la función f .
- Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX .

(Septiembre 2009 - Opción A)

Problema 3.10.6 (3 puntos) El beneficio semanal (en miles de euros) que obtiene una central lechera por la producción de leche desnatada está determinado por la función:

$$B(x) = -x^2 + 7x - 10$$

en la que x representa los hectolitros de leche desnatada producidos en una semana.

- Representétese gráficamente la función $B(x)$ con $x \geq 0$.
- Calcúlense los hectolitros de leche desnatada que debe producir cada semana la central lechera para maximizar su beneficio. Calcúlese dicho beneficio máximo.
- Calcúlense las cantidades mínima y máxima de hectolitros de leche desnatada que debe producir la central lechera cada semana para no incurrir en pérdidas (es decir, beneficio negativo).

(Septiembre 2009 - Opción B)

3.11. Año 2010

Problema 3.11.1 (3 puntos) Se considera la curva de ecuación cartesiana:

$$y = x^2$$

- Calcúlense las coordenadas del punto en el que la recta tangente a la curva propuesta es paralela a la bisectriz del primer cuadrante.
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por las gráficas de la curva propuesta, la recta tangente a dicha curva en el punto $P(1, 1)$ y el eje OX .

(Modelo 2010 - Opción A)

Problema 3.11.2 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + c, \quad a, b, c \in R$$

- ¿Qué valores deben tomar a , b y c para que la gráfica de f pase por el punto $(0, 0)$ y además tenga un máximo relativo en el punto $(1, 2)$?
- Para $a = 1$, $b = -2$ y $c = 0$, determínense los puntos de corte de f con los ejes de coordenadas.
- Para $a = 1$, $b = -2$ y $c = 0$, calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de la función f y el eje OX .

(Modelo 2010 - Opción B)

Problema 3.11.3 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

- a) Determinense su asíntotas.
- b) Calcúlense sus máximos y mínimos locales. Esbócese la gráfica de f .
- c) Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por las rectas verticales $x = 2$, $x = 3$, la gráfica de f y la recta de ecuación $y = x + 1$.

(Junio 2010 - Opción A)

Problema 3.11.4 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - x + a & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{3}{bx} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Calcúlense los valores de a , b , para que f sea continua y derivable en todos los puntos.
- b) Para $a = 6$, $b = 3/4$, determinense los puntos de corte de la gráfica f con los ejes de coordenadas.
- c) Para $a = 6$, $b = 3/4$, calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de la función f , el eje OX y la recta vertical $x = 2$.

(Junio 2010 - Opción B)

Problema 3.11.5 (3 puntos) El coste de un marco para una ventana rectangular es de 50 euros por cada metro de lado vertical y de 25 euros por cada metro de lado horizontal. Se desea construir una ventana de superficie igual a 2 m². Calcúlense las dimensiones (largo y alto) para que el marco sea lo más barato posible. Calcúlese el precio mínimo del marco de dicha ventana.

(Septiembre 2010 - Opción A)

Problema 3.11.6 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - a & \text{si } x \leq -1 \\ -3x^2 + b & \text{si } -1 < x < 1 \\ \log x + a & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Calcúlese a , b , para que f sea continua en todos los puntos.
- b) Para $a = 0$, $b = 3$, represéntese gráficamente la función f .
- c) Para $a = 0$, $b = 3$, calcúlese la integral definida $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

Nota.- La notación \log representa logaritmo neperiano.

(Septiembre 2010 - Opción B)

3.12. Año 2011

Problema 3.12.1 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 6$$

- Calcúlense a y b para que la función f tenga un máximo relativo en $x = 1$ y un mínimo relativo en $x = 2$
- Para $a = b = 0$, calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y la recta de ecuación $y = 8x - 6$.

(Modelo 2011 - Opción A)

Problema 3.12.2 (3 puntos) Una empresa produce cable de fibra óptica, que vende a un precio de x euros por metro. Se estima que la venta diaria de cable (en miles de metros) se expresa en términos del precio mediante la función:

$$D(x) = \frac{6}{x^2 + 1}$$

- Obténgase la función $I(x)$ que determina los ingresos diarios de la empresa en función del precio x .
- Calcúlese el precio x que ha de fijarse para que el ingreso diario sea máximo y calcúlese dicho ingreso máximo.
- Detérminense las asíntotas de $I(x)$ y esbócese la gráfica de la función $I(x)$.

(Modelo 2011 - Opción B)

Problema 3.12.3 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por: $f(x) = \frac{3x}{x^2 - 2}$

- Especifíquese su dominio de definición y los puntos de corte de la gráfica con los ejes coordenados. Detérminense las asíntotas de f .
- Detérminese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

- Calcúlese la integral definida $\int_2^3 f(x) dx$

(Junio 2011 - Opción A)

Problema 3.12.4 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$\begin{cases} \frac{a}{x} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{x^2 - b}{4} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

- Calcúlese a, b para que f sea continua y derivable en $x = -1$
- Para $a = 1, b = 3$, represéntese gráficamente la función f .
- Calcúlese el valor b para que $\int_0^3 f(x) dx = 6$.

(Junio 2011 - Opción B)

Problema 3.12.5 (3 puntos). Se considera la función real de variable real definida por: $f(x) = \frac{(x+1)^2}{x^2+1}$

- Determinense las asíntotas de f . Calcúlese los extremos relativos de f .
- Represéntese gráficamente la función f .
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f , la recta horizontal $y = 1$, la recta vertical $x = 1$.

(Septiembre 2011 - Opción A)

Problema 3.12.6 (3 puntos). Se considera un rectángulo R de lados x, y .

- Si el perímetro de R es igual a $12 m$, calcúlese x, y para que el área de R sea máxima y calcúlese el valor de dicha área máxima.
- Si el área de R es igual a $36 m^2$, calcúlese x, y para que el perímetro de R sea mínimo y calcúlese el valor de dicho perímetro mínimo.

(Septiembre 2011 - Opción B)

Problema 3.12.7 (3 puntos). Se considera la función real de variable real definida por: $f(x) = 2(x-1)^2(x+3)$

- Determinense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Calcúlese sus extremos relativos.
- Calcúlese los puntos de corte de la gráfica de f con el eje OX . Esbócese la gráfica de f .

- c) Calcúlese el valor del área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX .

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción A)

Problema 3.12.8 (3 puntos). Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{si } x \leq 1/2 \\ bx + c & \text{si } x > 1/2 \end{cases}$$

Calcúlese los valores de a , b , c para que f satisfaga todas las condiciones siguientes:

- $a > 0$
- La función f es continua y derivable en $x = 1/2$.
- El valor del área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f , el eje de abscisas y las rectas verticales $x = -2$, $x = 0$, es igual a $32/3$.

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción B)

3.13. Año 2012

Problema 3.13.1 (3 puntos) Una empresa de productos de limpieza fabrica cajas de cartón con tapa, para comercializar un determinado tipo de detergente. Las cajas son prismas rectos de 9000 cm^3 de volumen y base rectangular de largo igual al doble de su anchura. Calcúlese las dimensiones en centímetros (largo, anchura, altura) que ha de tener cada caja para que la superficie de cartón empleada en su fabricación sea mínima.

(Modelo 2012 - Opción A)

Problema 3.13.2 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x < 0 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 3 - x & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- a) Calcúlese a , b y c , para que la función f sea continua en todos los puntos y derivable en $x = 0$.
- b) Para $a = 0$, calcúlese b , c , para que la función f sea continua en todos los puntos y calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX .
- c) Para $a = b = 1$, $c = 2$, calcúlese la integral definida $\int_{-1}^3 f(x) dx$.

(Modelo 2012 - Opción B)

Problema 3.13.3 (3 puntos) Una empresa vinícola tiene plantadas 1200 cepas de vid en una finca, produciendo cada cepa una media de 16 kg de uva. Existe un estudio previo que garantiza que por cada cepa que se añade a la finca, las cepas producen de media 0,01 kg menos de uva cada una. Determínese el número de cepas que se deben añadir a las existentes para que la producción de uvas de la finca sea máxima.

(Junio 2012 - Opción A)

Problema 3.13.4 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ -x^2 + 4x - 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- Estúdiense la continuidad y la derivabilidad de la función f .
- Represéntese gráficamente la función f .
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f , el eje OX , el eje OY , y la recta $x = 2$.

(Junio 2012 - Opción B)

Problema 3.13.5 (3 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{4 - 2x}{x^2}.$$

- Determínense los máximos y mínimos locales y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f .
- Hállense los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad de f .
- Determínense las asíntotas y los puntos de corte con los ejes. Esbócese la gráfica de f .

(Junio 2012(coincidente) - Opción A)

Problema 3.13.6 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = ax^2 - \frac{b}{x}$$

- Hállense los valores de a y b para que la recta tangente a la gráfica de f en $x = 1$ tenga como ecuación $y = 3x - 2$.
- Hállense los valores de a y b para que la función f tenga en $(1,0)$ un punto de inflexión.

- c) Hállense los valores de a y b de manera que f no tenga asíntotas y
- $$\int_0^1 f(x)dx = 1.$$

(Junio 2012(coincidente) - Opción B)

Problema 3.13.7 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por: $f(x) = \frac{x(2x - 1)}{x - 1}$.

- a) Determinéense las asíntotas de f . Calcúlese los extremos relativos de f .
- b) Representétese gráficamente la función f .
- c) Calcúlese $\int_2^5 \frac{f(x)}{x^2} dx$.

(Septiembre 2012 - Opción A)

Problema 3.13.8 (3 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x \leq 1 \\ x^3 - x^2 + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Calcúlese los valores de a y b para los que la función f es continua y derivable.
- b) Para $a = 0$ y $b = 1$, hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en los puntos en los que dicha tangente es paralela a la recta $y - 8x = 1$.
- c) Sea g la función real de variable real definida por $g(x) = 1 - 2x^2$. Para $a = 1$ y $b = 0$, calcúlese el área de la región plana acotada limitada por la gráfica de f y la gráfica de g .

(Septiembre 2012 - Opción B)

3.14. Año 2013

Problema 3.14.1 (2 puntos) Dada la función real de variable real $f(x) = \frac{3x^2 - 5}{x + 1}$

- a) Hállense sus asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.
- b) Hállense los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes de coordenadas y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

(Modelo 2013 - Opción A)

Problema 3.14.2 (2 puntos) Dada la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 3x + 5 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Estúdiese la continuidad de la función en R .

b) Calcúlese $\int_0^2 f(x) dx$

(Modelo 2013 - Opción A)

Problema 3.14.3 (2 puntos) El coste de fabricación de una serie de hornos microondas viene dado por la función $C(x) = x^2 + 40x + 30000$; donde x representa el número de hornos fabricados. Supongamos que cada horno se vende por 490 euros.

a) Determínese la función de beneficios.

b) ¿Cuántos microondas deben fabricarse y venderse para que los beneficios sean máximos? ¿Cuál es el importe de esos beneficios máximos?

(Modelo 2013 - Opción B)

Problema 3.14.4 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = 3e^{-2x}$

a) Obtégase la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $x = 0$

b) Calcúlese el área de la región plana acotada limitada por la gráfica de f , las rectas $x = 0$, $x = 0,5$ y el eje de abscisas.

(Junio 2013 - Opción A)

Problema 3.14.5 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \frac{a + 3x}{x^2 - 4x + 3} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Estúdiese la continuidad de f en $x = 0$ para los distintos valores del parámetro a .

b) Determínense las asíntotas de la función.

(Junio 2013 - Opción B)

Problema 3.14.6 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = x(5 - x)^2$

- Determinense los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .
- Determinense los intervalos de concavidad y convexidad de f .

(Junio 2013 - Opción B)

Problema 3.14.7 (2 puntos) Calcúlese la derivada de cada una de las funciones siguientes ($\ln x$ denota al logaritmo neperiano de x):

- $f(x) = (x^3 + 2x) \cdot \ln x$
- $g(x) = \frac{2x}{x-1} \cdot e^{x^2}$

(Junio 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.14.8 (2 puntos) Se considera la función real de variable real $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$

- Representétese gráficamente f .
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje de abscisas.

(Junio 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.14.9 (2 puntos) Supongamos que el consumo eléctrico de un país (expresado en gigavatios) entre las 0 y las 8 horas viene dado por la función $c(x) = 10x - x^2 + 16$, con $0 \leq x \leq 8$.

- Determinéese cuáles son el consumo máximo y el mínimo en ese intervalo de tiempo, y los instantes en los que se alcanzan.
- Calcúlese $\frac{\int_0^8 c(x) dx}{8}$ (que representa el consumo medio a lo largo de esas 8 horas).

(Junio 2013 (coincidente)- Opción B)

Problema 3.14.10 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 9}$

- Hállense las asíntotas de f .
- Determinéese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$

(Septiembre 2013 - Opción A)

Problema 3.14.11 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln(2x - 1) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- Calcúlese a para que la función f sea continua en todo R :
- Representétese gráficamente la función para el caso $a = 3$.

Nota: $\ln x$ denota al logaritmo neperiano del número x .

(Septiembre 2013 - Opción B)

Problema 3.14.12 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$

- Determinéense los extremos relativos de f .
- Calcúlese la integral definida $\int_0^1 f(x) dx$.

(Septiembre 2013 - Opción B)

Problema 3.14.13 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$$

- Hállense sus asíntotas horizontales, verticales y oblicuas si es que existen.
- Determinéense los puntos de corte con los ejes de coordenadas y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.14.14 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = \begin{cases} 4x^3 - 30 & \text{si } x < 2 \\ 3x^2 + 2x + b & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

- Determinéense el valor de b para que la función sea continua en R .
- Para $b = 0$, calcúlese $\int_0^3 f(x) dx$.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.14.15 (2 puntos) Se considera la función real de variable real $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$

- a) Determinéense los puntos de corte con los ejes de coordenadas así como sus límites cuando x tiende a infinito y a menos infinito.
- b) Determinéense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como sus máximos y sus mínimos locales.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción B)

3.15. Año 2014


Problema 3.15.1 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-4}{x+2} - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- a) Determinéense las asíntotas de la función y los puntos de corte con los ejes.
- b) Calcúlese $\int_{-1}^1 f(x) dx$

(Modelo 2014 - Opción A)

Problema 3.15.2 (2 puntos) La figura representa la gráfica de una función $f : [-2; 5] \rightarrow R$. Contéstese razonadamente a las preguntas planteadas.



- a) ¿Para qué valores de x es $f'(x) > 0$?
- b) ¿En qué puntos del intervalo $[-6, 5]$ f alcanza sus extremos relativos?
- c) ¿Cuál es el signo de $\int_2^4 f(x) dx$?
- d) ¿En qué valores de $(-6; 5)$ f no es derivable?

(Modelo 2014 - Opción B)

Problema 3.15.3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 1 \\ x^2 - 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x + b & \text{si } x > 3 \end{cases}$

a) Determinéense a y b para que f sea continua en todo R .

b) Calcúlese $\int_1^3 f(x) dx$.

(Junio 2014 - Opción A)

Problema 3.15.4 (2 puntos) Dada la función real de variable real $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 2x$.

a) Determinéense la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

b) Calcúlese $\int_2^3 f(x) dx$.

(Junio 2014 - Opción B)

Problema 3.15.5 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{x^2}{x - 2}$$

a) Determinéense sus asíntotas.

b) Determinéense el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .

(Junio 2014 - Opción B)

Problema 3.15.6 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$$

a) Hállense sus asíntotas horizontales y oblicuas, si es que existen.

b) Determinéense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.15.7 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{si } x > 0 \\ \frac{mx-6}{x-3} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- Determinése para qué valores del parámetro m la función f es continua en $x = 0$.
- Calcúlese la recta tangente a la gráfica de f en $x = 5$.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción B)

Problema 3.15.8 (2 puntos) Para la función real de variable real $f(x) = \frac{(5x+7)^{10}}{2}$

- Calcúlese su función derivada.
- Calcúlese $\int f(x) dx$.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción B)

Problema 3.15.9 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{(x-3)^2}{x(x-2)}$$

- Determinése las asíntotas de f .
- Estudíese si la función f es creciente o decreciente en un entorno de $x = 4$.

(Septiembre 2014 - Opción A)

Problema 3.15.10 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = 2e^{x+1}$.

- Esbócese la gráfica de la función f .
- Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 1$.

(Septiembre 2014 - Opción A)

Problema 3.15.11 (2 puntos) función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{\lambda x}{4 + x^2}$$

- a) Calcúlese el valor del parámetro real λ para que la recta tangente a la gráfica de f en $x = -1$ sea paralela a la recta $y = 2x - 3$.
- b) Calcúlese $\int_0^2 f(x) dx$ para $\lambda = 1$.

(Septiembre 2014 - Opción B)

Problema 3.15.12 (2 puntos) Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ (x - 1)^3 + a & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Determinése el valor de la constante a para que sea una función continua en todo su dominio.
- b) Para $a = 0$, calcúlese el valor de la integral $\int_1^5 f(x) dx$.

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.15.13 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$, contéstese razonadamente a las preguntas:

- a) Calcúlense su dominio de definición, los puntos de corte con los ejes, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) Hállense las asíntotas, si las tuviere, y esbócese la gráfica de la función f .

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción B)

Problema 3.15.14 (2 puntos) Se considera la función real de variable real $f(x) = x^3 - ax + 1$

- a) Determinése el valor de a para que la función tenga un máximo local en $x = -2$ y un mínimo local en $x = 2$.
- b) Para el caso en el que $a = 48$, hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = 5$.

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción B)

3.16. Año 2015

Problema 3.16.1 (2 puntos)

- a) Dibújese, de manera esquemática, la región acotada del plano limitada por las gráficas de las curvas

$$y = \sqrt{6x}; \quad y = \frac{x^2}{6}$$

b) Calcúlese el área de la región descrita en el apartado anterior.

(Modelo 2015 - Opción A)

Problema 3.16.2 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = 24x - 15x^2 + 2x^3 + 2$$

- a) Determinéense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) Hállense sus extremos relativos y sus puntos de inflexión.

(Modelo 2015 - Opción B)

Problema 3.16.3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 2x - 3}$$

- a) Determinéense sus asíntotas.
- b) Determinése la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = -1,5$.

(Modelo 2015 - Opción B)

Problema 3.16.4 (2 puntos) Sabiendo que la derivada de una función real de variable real f es

$$f'(x) = 3x^2 + 2x$$

- a) Calcúlese la expresión de $f(x)$ sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(1, 4)$.
- b) Calcúlese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto $(1, 4)$.

(Junio 2015 - Opción A)

Problema 3.16.5 (2 puntos) Sean las funciones reales de variable real

$$f(x) = x^2 - 6x, \quad g(x) = x - 10$$

- a) Representéense gráficamente las funciones f y g .
- b) Calcúlese el área del recinto plano acotado por las gráficas de las funciones f y g .

(Junio 2015 - Opción A)

Problema 3.16.6 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} & \text{si } x < 2 \\ 3x + m & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

- Calcúlese el valor del parámetro real m para que la función f sea continua en $x = 2$.
- Calcúlese $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(Junio 2015 - Opción B)

Problema 3.16.7 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 + a}{x - 1}$$

- Calcúlese el valor del parámetro real a , sabiendo que la función alcanza un extremo relativo en $x = -1$. Compruébese que se trata de un máximo.
- Para $a = 1$, calcúlese $\int_{-1}^0 (x - 1)f(x)dx$.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.16.8 (2 puntos) Se sabe que la derivada de cierta función real de variable real f es $f'(x) = x^2(x^2 - 2x - 15)$

- Determinense los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f .
- Determinense los extremos relativos de f , indicando si se trata de máximos o mínimos relativos.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.16.9 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida como

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + a & \text{si } 0 < x < 2 \\ bx + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- Determinense los valores que deben tomar los parámetros reales a y b para que f sea continua en toda la recta real.
- Determinense la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = -1$.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción B)

Problema 3.16.10 (2 puntos) Se considera la función real de variable real definida por $f(x) = 4x^3 - ax^2 - ax + 2$, $a \in \mathbb{R}$.

a) Determinése el valor del parámetro real a para que la función alcance un extremo relativo en $x = 1/2$. Compruébese que se trata de un mínimo.

b) Para $a = 2$, calcúlese el valor de $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

(Septiembre 2015 - Opción A)

Problema 3.16.11 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = -8x^2 + 24x - 10$$

a) Calcúlense los máximos y mínimos locales de f y representése gráficamente la función.

b) Determinése el área del recinto cerrado comprendido entre la gráfica de la función f y las rectas $x = 1$, $x = 2$ e $y = 4$.

(Septiembre 2015 - Opción B)

Problema 3.16.12 (2 puntos) Considérese la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^3}{(x-2)^2} + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Estúdiese la continuidad de esta función.

b) Determinése las asíntotas de esta función.

(Septiembre 2015 - Opción B)

Problema 3.16.13 (2 puntos) Se considera la función real de variable real: $f(x) = e^{x^2}$

a) Determinése sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

b) Determinése sus intervalos de concavidad (\cup) y convexidad (\cap).

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 3.16.14 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 6 & \text{si } x \leq 0 \\ \ln(x+1) + m & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Nota: \ln denota el logaritmo neperiano.

- a) Determinése para qué valores del parámetro m la función f es continua en $x = 0$.
- b) Determinése la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = -2$.

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción B)

Problema 3.16.15 (2 puntos) Dada la función real de variable real $f(x) = (2x + 3)^5 + e^{2x}$

- a) Calcúlese su función derivada.
- b) Calcúlese $\int f(x) dx$.

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción B)

3.17. Año 2016

Problema 3.17.1 (2 puntos) Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \frac{x^3}{1 - x^2}$$

- a) Estúdiense y determinése sus asíntotas.
- b) Determinése sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

(Modelo 2016 - Opción A)

Problema 3.17.2 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = x^2 - 4x - 5$$

- a) Representése gráficamente la función f .
- b) Calcúlese el área de la región acotada del plano delimitada por la gráfica de f y el eje de abscisas.

(Modelo 2016 - Opción B)

Problema 3.17.3 (2 puntos) Dada la función real de variable real

$$f(x) = x^2 e^{x^2}$$

- a) Calcúlese su función derivada.
- b) Determinése sus intervalos de concavidad (\cap) y convexidad (\cup).

(Modelo 2016 - Opción B)

Problema 3.17.4 (2 puntos) Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = x^3 + 8$$

- Determinése el área de la región acotada delimitada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y por las rectas $x = -3$ y $x = -1$.
- Calcúlese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$.

(Junio 2016 - Opción A)

Problema 3.17.5 (2 puntos) Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x+b}{x-2} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{x^2+6x+5}{x^2+4x+3} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

- Determinése para qué valores del parámetro b la función $f(x)$ es continua en $x = -1$.
- Calcúlense las asíntotas de $f(x)$.

(Junio 2016 - Opción B)

Problema 3.17.6 (2 puntos) Sabiendo que la derivada de una función real de variable real es:

$$f'(x) = 6x^2 + 4x - 2$$

- Determinése la expresión de $f(x)$ sabiendo que $f(0) = 5$.
- Determinése los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f así como sus máximos y mínimos locales, si los tuviese.

(Junio 2016 - Opción B)

Problema 3.17.7 (2 puntos) Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = x^2 + 4$$

- Escríbase la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en $x = 2$.
- Determinése el área del recinto plano limitado por la gráfica de $f(x)$, la recta $y = 4x$ y el eje de ordenadas.

(Junio 2016 - Opción A (Coincidentes))

Problema 3.17.8 (2 puntos) Dada la función real de variable real:

$$f(x) = \frac{(x-1)^2}{x+2}$$

- Determinense las asíntotas de $f(x)$.
- Determinense los máximos y los mínimos relativos de $f(x)$.

(Junio 2016 - Opción A (Coincidentes))

Problema 3.17.9 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + b$$

- Determinense los valores de los parámetros reales a y b si se sabe que la recta $y = x$ es tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.
- Para $a = 1$ y $b = 0$, calcúlese el área del recinto plano limitado por la gráfica de $f(x)$ y el eje OX .

(Junio 2016 - Opción B (Coincidentes))

Problema 3.17.10 (2 puntos) Dada la función real de variable real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ ax + b & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ \frac{x}{\sqrt{x^3 + 1}} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- Determinense los valores que deben tomar los parámetros a y b para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$ y $x = 2$.
- Calcúlese, para $a = 4$ y $b = -2$, el área del recinto acotado por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 2$.

(Septiembre 2016 - Opción A)

Problema 3.17.11 (2 puntos) Se considera la función real de variable real:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x < 0 \\ -x^2 + 3x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Estudíese la continuidad y derivabilidad de la función.

- b) Determinéense los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = a$ es $m = -2$. Calcúlese, para cada valor de a obtenido, la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = a$.

(Septiembre 2016 - Opción B)

Problema 3.17.12 (2 puntos) Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 9}$$

- a) Calcúlense sus asíntotas.
- b) Determinéense los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

(Septiembre 2016 - Opción B)

www.musat.net

Capítulo 4

Probabilidad

4.1. Año 2000

Problema 4.1.1 (2 puntos) Si se escoge un número al azar en la guía telefónica de cierta ciudad española, la probabilidad de que sea nombre de un hombre es 0,7 y de que figure una mujer es 0,3. En dicha ciudad, la probabilidad de que un hombre trabaje es 0,8 y de que lo haga una mujer es 0,7. Se elige un número de teléfono al azar.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que corresponda a una persona que trabaja?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que corresponda a un hombre, sabiendo que pertenece a una persona que trabaja?

(Modelo 2000 - Opción A)

Problema 4.1.2 (2 puntos) Un examen consiste en elegir al azar dos temas de entre los diez del programa y desarrollar uno.

- a) ¿Qué probabilidad tiene un alumno, que sabe seis temas, de aprobar el examen?
- b) ¿Qué probabilidad tiene el mismo alumno de saberse uno de los dos temas elegidos y el otro no?

(Modelo 2000 - Opción B)

Problema 4.1.3 (2 puntos) De una urna con 4 bolas blancas y 2 negras se extraen al azar, sucesivamente y sin reemplazamiento, dos bolas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean blancas?
- b) Si la segunda bola ha sido negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera también lo haya sido?

(Junio 2000 - Opción A)

Problema 4.1.4 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,2$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,7$.

- a) Calcula $P(A \cap B)$ y razona si los sucesos A y B son independientes.
- b) Calcula $P(A \cup B)$.

(Junio 2000 - Opción B)

Problema 4.1.5 (2 puntos) La probabilidad de que un mes dado un cliente de una gran superficie compre un producto A es 0,6; la probabilidad de que compre un producto B es 0,5. Se sabe también que la probabilidad de que un cliente compre un producto B no habiendo comprado el producto A es 0,4.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente haya comprado sólo el producto B ?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente no haya comprado ninguno de los dos productos?

(Septiembre 2000 - Opción A)

Problema 4.1.6 (2 puntos) Una empresa emplea tres bufetes de abogados para tratar sus casos legales. La probabilidad de que un caso se deba remitir al bufete A es 0,3; de que se remita al bufete B es 0,5 y de que se remita al bufete C es 0,2. La probabilidad de que un caso remitido al bufete A sea ganado en los tribunales es 0,6; para el bufete B esta probabilidad es 0,8 y para el bufete C es 0,7.

- a) Calcúlese la probabilidad de que la empresa gane un caso.
- b) Sabiendo que un caso se ha ganado, determínese la probabilidad de que lo haya llevado el bufete A .

(Septiembre 2000 - Opción B)

4.2. Año 2001

Problema 4.2.1 (2 puntos) En una ciudad, la probabilidad de que uno de sus habitantes censados vote al partido A es 0,4; la probabilidad de vote al partido B es 0,35 y la probabilidad de que vote al partido C es 0,25. Por otro lado, las probabilidades de que un votante de cada partido lea diariamente algún periódico son, respectivamente, 0,4; 0,4 y 0,6. Se elige una persona de la ciudad al azar:

- a) Calcúlese la probabilidad de que lea algún periódico.
- b) La persona elegida lee algún periódico, ¿cuál es la probabilidad de que sea votante del partido B ?

(Modelo 2001 - Opción A)

Problema 4.2.2 (2 puntos) Una urna contiene 7 bolas blancas, 3 bolas rojas y 2 bolas negras. Se considera el experimento aleatorio consistente en extraer tres bolas de la urna, de forma sucesiva y sin reemplazamiento. Sean los sucesos $B_1 = \{ \text{La primera bola es blanca} \}$, $B_2 = \{ \text{La segunda bola es blanca} \}$ y $B_3 = \{ \text{La tercera bola es blanca} \}$.

- a) Expresese con ellos el suceso $\{ \text{Las bolas extraídas en primer y tercer lugar son blancas, y la extraída en segundo lugar no} \}$.
- b) Calcúlese la probabilidad del suceso $\{ \text{Las tres bolas son del mismo color} \}$.

(Modelo 2001 - Opción B)

Problema 4.2.3 (2 puntos) Una fabrica produce tres modelos de coche: A , B y C . Cada uno de los modelos puede tener motor de gasolina o diesel. Sabemos que el 60 % de los modelos son del tipo A y el 30 % del tipo B . El 30 % de los coches fabricados tienen motor diesel, el 30 % de los coches de modelo A son de tipo diesel y el 20 % de los coches del modelo B tienen motor diesel. Se elige un coche al azar. Se piden las probabilidades de los siguientes sucesos:

- a) El coche es del modelo C .
- b) El coche es del modelo A , sabiendo que tiene motor diesel.
- c) El coche tiene motor diesel, sabiendo que es del modelo C .

(Junio 2001 - Opción A)

Problema 4.2.4 (2 puntos) Tres máquinas A , B y C fabrican tornillos. En una hora, la máquina A fabrica 600 tornillos, la B 300 y la C 100. Las probabilidades de que las máquinas produzcan tornillos defectuosos son, respectivamente, de 0,01 para A , de 0,02 para B y de 0,03 para C . Al finalizar una hora se juntan todos los tornillos producidos y se elige uno al azar.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado la máquina A , sabiendo que no es defectuoso?

(Junio 2001 - Opción B)

Problema 4.2.5 (2 puntos) En un videoclub quedan 8 copias de la película A , 9 de la B y 5 de la C . Entran tres clientes consecutivos. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Los tres escojan la misma película.
- b) Dos escojan la película A y el otro la C .

(Septiembre 2001 - Opción A)

Problema 4.2.6 (2 puntos) Con el objetivo de recaudar fondos para un viaje, los alumnos de un instituto realizan una rifa con 500 números. Un alumno compra dos números.

- a) Si sólo hay un premio, ¿qué probabilidad tiene el alumno de que le toque a él?
- b) Si hay dos premios, ¿qué probabilidad tiene el alumno de que le toque al menos uno de ellos?

(Septiembre 2001 - Opción B)

4.3. Año 2002

Problema 4.3.1 (2 puntos) Un proveedor suministra lotes de materia prima y el 5% de ellos resulta defectuoso. Seleccionando al azar 3 lotes

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean defectuosos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo de lotes defectuosos sea 2?

(Modelo 2002 - Opción A)

Problema 4.3.2 (2 puntos) Una prueba para determinar cierta contaminación del agua presenta los siguientes resultados en probabilidad: 0,05 de falsos positivos, esto es, casos en los que el agua libre de contaminación, el test dice que el agua se encuentra contaminada. Si el agua está contaminada, el test lo detecta con probabilidad 0,99. El agua está libre de contaminación con probabilidad 0,99. Si se realizara una nueva prueba y el test indica que hay contaminación, calcular la probabilidad de que el agua esté libre de contaminación.

(Modelo 2002 - Opción B)

Problema 4.3.3 (2 puntos) Se tienen tres cajas iguales. La primera contiene 3 bolas blancas y 4 negras; la segunda contiene 5 bolas negras y, la tercera, 4 blancas y 3 negras.

- a) Se elige una caja al azar, y luego se extrae una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea negra?
- b) Si se extrae una bola negra de una de las cajas, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la segunda caja?

(Junio 2002 - Opción A)

Problema 4.3.4 (2 puntos) Se lanzan dos dados equilibrados de seis caras tres veces consecutivas.

- a) Calcular la probabilidad de que en los tres lanzamientos salga el seis doble.
- b) Calcular la probabilidad de que en los tres lanzamientos salga un doble distinto del seis doble.

(Junio 2002 - Opción B)

Problema 4.3.5 (2 puntos) Una persona desea jugar en una atracción de feria, donde regalan un peluche, si al tirar un dardo se acierta en el blanco. Si sólo se permite tirar tres dardos y la probabilidad de acertar en cada tirada es 0,3.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de llevarse el peluche?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de llevarse el peluche exactamente en el tercer intento?, ¿y de llevarse exactamente en el segundo?

(Septiembre 2002 - Opción A)

Problema 4.3.6 (2 puntos) Un día determinado, en una tienda de ropa joven, se han realizado 400 ventas pagadas con la tarjeta de crédito V y 350 ventas pagadas con la tarjeta MC . Las ventas restantes del día han sido abonadas en metálico. Se comprueba que 150 de las ventas pagadas con la tarjeta de crédito V superan los 150 euros, mientras que 300 de las ventas pagadas con MC superan esa cantidad. Se extrae al azar un comprobante de las ventas del día pagadas con tarjeta de crédito.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que corresponda a una compra superior a 150 euros?
- b) Si la compra es inferior a 150 euros, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido pagada con la tarjeta MC ?

(Septiembre 2002 - Opción B)

4.4. Año 2003

Problema 4.4.1 (2 puntos) El 45% del censo de cierta ciudad vota al candidato A , el 35% al candidato B y el resto se abstiene. Se elige al azar tres personas del censo. Calcular la probabilidad de los siguientes sucesos:

- a) Las tres personas votan al candidato A .
- b) Dos personas votan al candidato A y la otra al candidato B .
- c) Al menos una de las tres personas se abstiene.

(Junio 2003 - Opción A)

Problema 4.4.2 (2 puntos) De una baraja española de cuarenta cartas se extraen sucesivamente tres cartas al azar. Determinar la probabilidad de obtener:

- a) Tres reyes.
- b) Una figura con la primera carta, un cinco con la segunda y un seis con la tercera.
- c) Un as, un tres y un seis, en cualquier orden.

(Junio 2003 - Opción B)

Problema 4.4.3 (2 puntos) El test para detectar una sustancia contaminante en agua, presenta los siguientes resultados: si el agua no está contaminada, suceso que ocurre con una probabilidad igual a 0,99, el resultado del test es que el agua está contaminada con una probabilidad igual a 0,05. Cuando el agua está contaminada, el test lo detecta con una probabilidad igual a 0,99. Se ha realizado una prueba y el test indica que hay contaminación. Calcular la probabilidad de que el agua no esté realmente contaminada. Interpretar el valor numérico obtenido.

(Septiembre 2003 - Opción A)

Problema 4.4.4 (2 puntos) Se elige un número natural entre el 1 y el 20 de manera que todos tengan la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Cuál es la probabilidad de que el número escogido sea divisible por 2 o por 3? ¿Cuál es la probabilidad de que sea divisible por 3 y no por 6?

(Septiembre 2003 - Opción B)

4.5. Año 2004

Problema 4.5.1 (2 puntos) Un rosal no está en buen estado y, por tanto, si se riega tiene la misma probabilidad de mantenerse que de secarse. La probabilidad de que se mantenga si no se riega es de 0,25. La probabilidad de no regar el rosal es de $2/3$. Si el rosal se ha secado, ¿Cuál es la probabilidad de no haberlo regado?.

(Modelo 2004 - Opción A)

Problema 4.5.2 (2 puntos) Sobre los sucesos A y B se conocen las siguientes probabilidades:

$$P(A) = 0,7, \quad P(B) = 0,5 \quad P(A \cap B) = 0,45$$

Calcular:

a) $P(B|A)$

b) $P(A^c \cap B^c)$

Nota: A^c representa el suceso complementario de A .

(Modelo 2004 - Opción B)

Problema 4.5.3 (2 puntos) Dos expertos, E_1 y E_2 , realizan peritaciones para una cierta compañía de seguros. La probabilidad de que una peritación haya sido realizada por E_1 es 0,55 y por E_2 es 0,45. Si una peritación ha sido realizada por E_1 , la probabilidad de que de lugar a indemnización es 0,98 y si ha sido realizada por E_2 , la probabilidad de que de lugar al pago de una indemnización es 0,90. Un siniestro ha supuesto a la compañía el pago de una indemnización. Hallar la probabilidad de que la peritación haya sido realizada por E_2 .

(Junio 2004 - Opción A)

Problema 4.5.4 (2 puntos) En una empresa se producen dos tipos de bombillas: halógenas y de bajo consumo, en una proporción de 3 a 4, respectivamente. La probabilidad de que una bombilla halógena sea defectuosa es 0,02 y de que una de bajo consumo sea defectuosa es 0,09. Se escoge al azar una bombilla y resulta no defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea halógena?.

(Junio 2004 - Opción B)

Problema 4.5.5 (2 puntos) Una cierta instalación de seguridad tiene instalados dos indicadores. Ante una emergencia los indicadores se activan de forma independiente. La probabilidad de que se active el primer indicador es 0,95 y de que se active el segundo es 0,90.

- a) Hallar la probabilidad de que ante una emergencia se active sólo uno de los indicadores.
- b) Hallar la probabilidad de que ante una emergencia se active al menos uno de los indicadores.

(Septiembre 2004 - Opción A)

Problema 4.5.6 (2 puntos) En una población, el 40% son hombres y el 60% mujeres. En esa población el 80% de los hombres y el 20% de las mujeres son aficionados al fútbol.

- a) Calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar sea aficionada al fútbol.
- b) Elegida al azar una person resulta ser aficionada al futbol, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?.

(Septiembre 2004 - Opción B)

4.6. Año 2005

Problema 4.6.1 (2 puntos) Un ajedrecista gana una partida con probabilidad 0,6, la empata con probabilidad 0,3 y la pierde con probabilidad 0,1. El jugador juega dos partidas.

- a) Describir el espacio muestral y la probabilidad de cada uno de los resultados de este experimento aleatorio.
- b) Calcular la probabilidad de que gane al menos una partida.

(Modelo 2005 - Opción A)

Problema 4.6.2 (2 puntos) En un centro de enseñanza hay 240 estudiantes matriculados en 2º curso de Bachillerato. La siguiente tabla recoge su distribución por sexo y por opción que se cursa

	Chicas	Chicos
Científico – Tecnológica	64	52
Humanidades y C. Sociales	74	50

Si se elige un estudiante al azar de entre los que cursan 2º de Bachillerato en ese centro, calcular la probabilidad de que:

- a) No curse la opción Científico-Tecnológica.
- b) Si es chico, curse la opción de Humanidades y Ciencias Sociales.

(Modelo 2005 - Opción B)

Problema 4.6.3 (2 puntos) Una caja con una docena de huevos contiene dos rotos. Se extraen al azar sin reemplazamiento (sin devolverlos después y de manera consecutiva) cuatro huevos.

- a) Calcular la probabilidad de extraer los cuatro huevos en buen estado.
- b) Calcular la probabilidad de extraer de entre los cuatro huevos, exactamente uno roto.

(Junio 2005 - Opción A)

Problema 4.6.4 (2 puntos) En un experimento aleatorio consistente en lanzar simultáneamente tres dados equilibrados de seis caras, se pide calcular la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: "Obtener tres unos", "Obtener al menos un dos", "Obtener tres números distintos" y "Obtener una suma de cuatro".

(Junio 2005 - Opción B)

Problema 4.6.5 (2 puntos) En un colectivo de inversores bursátiles, el 20 % realiza operaciones vía internet. De los inversores que realizan operaciones vía internet, un 80 % consulta InfoBolsaWeb. De los inversores bursátiles que no realizan inversiones vía internet sólo un 20 % consulta InfoBolsaWeb. Se pide:

- a) Obtener la probabilidad de que un inversor elegido al azar en este colectivo consulte InfoBolsaWeb.
- b) Si se elige al azar un inversor bursátil de este colectivo y resulta que consulta InfoBolsaWeb, ¿cuál es la probabilidad de que realice operaciones por internet?.

(Septiembre 2005 - Opción A)

Problema 4.6.6 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos, tales que $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(\bar{B}) = \frac{2}{5}$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{3}{4}$. Calcular

- a) $P(B|A)$.
- b) $P(\bar{A}|B)$.

Nota: \bar{A} representa el suceso contrario del suceso A .

(Septiembre 2005 - Opción B)

4.7. Año 2006

Problema 4.7.1 (2 puntos) Se dispone de la siguiente información relativa a los sucesos A y B :

$$P(A) = 0,6 \quad P(B) = 0,2 \quad P(A \cap B) = 0,12$$

a) calcular las probabilidades de los sucesos

$$(A \cup B) \text{ y } (A|(A \cup B))$$

b) ¿Son incompatibles? ¿Son independientes?

(Modelo 2006 - Opción A)

Problema 4.7.2 (2 puntos) Una urna contiene dos bolas. La urna se llenó tirando una moneda equilibrada al aire dos veces y poniendo una bola blanca por cada cara y una negra por cada cruz. Se extrae una bola de la urna y resulta ser blanca. Hallar la probabilidad de que la otra bola de la urna sea también blanca.

(Modelo 2006 - Opción B)

Problema 4.7.3 (2 puntos) Una persona cuida de su jardín pero es bastante distraída y se olvida de regarlo a veces. La probabilidad de que se olvide de regar el jardín es $2/3$. El jardín no está en muy buenas condiciones, así que si se le riega tiene la misma probabilidad de progresar que de estropearse, pero la probabilidad de que progrese si no se le riega es de $0,25$.

Si el jardín se ha estropeado, ¿cuál es la probabilidad de que la persona olvidara regarlo?

(Junio 2006 - Opción A)

Problema 4.7.4 (2 puntos) Se considera el experimento consistente en lanzar una moneda equilibrada y un dado. Se pide:

a) Describir el espacio muestral de este experimento.

b) Determinar la probabilidad del suceso: "obtener una cara en la moneda y un número par en el dado".

(Junio 2006 - Opción B)

Problema 4.7.5 (Puntuación máxima: 2 puntos)

Los tigres de cierto país proceden de tres reservas: el 30 % de la primera, el 25 % de la segunda y el 45 % de la tercera. La proporción de tigres albinos de la primera reserva es 0,2 %, mientras que dicha proporción es 0,5 % en la segunda, y 0,1 % en la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de que un tigre de ese país sea albino?

(Septiembre 2006 - Opción A)

Problema 4.7.6 (Puntuación máxima: 2 puntos)

Una urna contiene 10 bolas blancas y 5 negras. Se extraen dos bolas al azar sin reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que sean del mismo color?

(Septiembre 2006 - Opción B)

4.8. Año 2007

Problema 4.8.1 (2 puntos) Según un cierto estudio, el 40 % de los hogares europeos tienen contratado acceso a internet, el 33 % tiene contratada televisión por cable, y el 20 % disponen de ambos servicios. Se selecciona un hogar europeo al azar.

- ¿Cuál es la probabilidad de que sólo tenga contratada la televisión por cable?
- ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios?

(Junio 2007 - Opción A)

Problema 4.8.2 (2 puntos) Los pianistas de la isla sordina se forman en tres conservatorios, C_1 , C_2 y C_3 , que forman al 40 %, 35 % y 25 % de los pianistas, respectivamente. Los porcentajes de pianistas virtuosos que producen estos conservatorios son del 5 %, 3 % y 4 %, respectivamente. Se selecciona un pianista al azar.

- Calcular la probabilidad de que sea virtuoso.
- El pianista resulta ser virtuoso. Calcular la probabilidad de que se haya formado en el primer conservatorio C_1 .

(Junio 2007 - Opción B)

Problema 4.8.3 (2 puntos) En el departamento de lácteos de un supermercado se encuentran mezclados y a la venta 100 yogures de la marca A , 60 de la marca B y 40 de la marca C . La probabilidad de que un yogur esté caducado es 0,01 para la marca A ; 0,02 para la marca B y 0,03 para la marca C . Un comprador elige un yogur al azar.

- Calcular la probabilidad de que el yogur esté caducado.
- Sabiendo que el yogur elegido está caducado, ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la marca B ?

(Septiembre 2007 - Opción A)

Problema 4.8.4 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que:

$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}$$

Calcular:

$$P(A \cup B), \quad P(A \cap B), \quad P(\bar{A}|B), \quad P(\bar{B}|A)$$

(Septiembre 2007 - Opción B)

4.9. Año 2008

Problema 4.9.1 (2 puntos) Un instituto tiene dos grupos de 2º de Bachillerato. El grupo A está formado por 18 alumnas, de las cuales 5 juegan al baloncesto, y 12 alumnos, 7 de los cuales juegan al mismo deporte. El grupo B está formado por 12 alumnas, 4 de ellas jugadoras de baloncesto, y 13 alumnos, 7 de los cuales practican baloncesto.

- Si se elige un alumno de 2º de bachillerato al azar, calcular la probabilidad de que sea mujer.
- ¿En qué grupo es más probable elegir al azar un estudiante que juegue al baloncesto?

(Modelo 2008 - Opción A)

Problema 4.9.2 (2 puntos) La orquesta musical está formada por tres tipos de instrumentos, 30 de madera, 15 de viento y 5 de percusión. La víspera de un concierto se ponen enfermos dos músicos. Calcular la probabilidad de que:

- Ambos toquen instrumentos de viento.
- Ambos toquen el mismo tipo de instrumento.

(Modelo 2008 - Opción B)

Problema 4.9.3 (2 puntos) En un juego consistente en lanzar dos monedas indistinguibles y equilibradas y un dado de seis caras equilibrado, un jugador gana si obtiene dos caras y un número par en el dado, o bien exactamente una cara y un número mayor o igual a cinco en el dado.

- Calcúlese la probabilidad de que un jugador gane.
- Se sabe que una persona ha ganado. ¿Cuál es la probabilidad de que obtuviera dos caras al lanzar las monedas?

(Junio 2008 - Opción A)

Problema 4.9.4 (2 puntos) Se consideran dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, tales que:

$$P(A) = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cup B) = \frac{1}{2}$$

- a) ¿Son A y B sucesos independientes? Razónese.
- b) Calcúlese $P(\overline{A}|\overline{B})$.

Nota: La notación \overline{A} representa al suceso complementario de A .
(Junio 2008 - Opción B)

Problema 4.9.5 (2 puntos) Se consideran dos actividades de ocio: A = ver televisión y B = visitar centros comerciales. En una ciudad, la probabilidad de que un adulto practique A es igual a 0,46; la probabilidad de que practique B es igual a 0,33 y la probabilidad de que practique A y B es igual a 0,15.

- a) Se selecciona al azar un adulto de dicha ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que no practique ninguna de las dos actividades anteriores?
- b) Se elige al azar un individuo de entre los que practican alguna de las dos actividades. ¿Cuál es la probabilidad de que practique las dos actividades?

(Septiembre 2008 - Opción A)

Problema 1 (2 puntos) Se supone que las señales que emite un determinado telégrafo son *punto* y *raya* y que el telégrafo envía un *punto* con probabilidad $\frac{3}{7}$ y una *raya* con probabilidad $\frac{4}{7}$. Los errores en la transmisión pueden hacer que cuando se envíe un *punto* se reciba una *raya* con probabilidad $\frac{1}{4}$ y que cuando se envíe una *raya* se reciba un *punto* con probabilidad $\frac{1}{3}$.

$$P(\text{raya}|\text{punto}) = \frac{1}{4}, \quad P(\text{punto}|\text{raya}) = \frac{1}{3}$$

- a) Si se recibe una *raya*, ¿cuál es la probabilidad de que se hubiera enviado realmente una *raya*?
- b) Suponiendo que las señales se envían con independencia, ¿cuál es la probabilidad de que si se recibe *punto* – *punto* se hubiera enviado *raya* – *raya*?

(Septiembre 2008 - Opción B)

4.10. Año 2009

Problema 4.10.1 (2 puntos) Calcúlese la probabilidad de cada uno de los sucesos siguientes:

- Obtener dos caras y una cruz en el lanzamiento de tres monedas equilibradas e indistinguibles.
- Obtener una suma de puntos igual a seis o siete en el lanzamiento de dos dados de seis caras equilibrados e indistinguibles.

(Modelo 2009 - Opción A)

Problema 4.10.2 (2 puntos) La probabilidad de que un vehículo de una cierta compañía de coches tenga un accidente es igual a 0,2. Si uno de los vehículos sufre un accidente, la probabilidad de que necesite la asistencia de una grúa es igual a 0,85. Por otra parte, la probabilidad de que uno de los vehículos necesite la asistencia de una grúa sin haber tenido un accidente es igual a 0,1.

- Se elige al azar un vehículo de dicha compañía, ¿cuál es la probabilidad de que necesite la asistencia de una grúa?
- Si el vehículo elegido ha necesitado la asistencia de una grúa, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido por causa de un accidente?

(Modelo 2009 - Opción B)

Problema 4.10.3 (2 puntos) Se consideran tres sucesos A , B y C de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A) = \frac{1}{2}; \quad P(B) = \frac{1}{3}; \quad P(C) = \frac{1}{4};$$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{2}{3}; \quad P(A \cap B \cap C) = 0; \quad P(A|B) = P(C|A) = \frac{1}{2}$$

- Calcúlese $P(C \cap B)$.
- Calcúlese $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$. La notación \bar{A} representa al suceso complementario de A .

(Junio 2009 - Opción A)

Problema 4.10.4 (2 puntos) Para la construcción de un luminoso de feria se dispone de un contenedor con 200 bombillas blancas, 120 bombillas azules y 80 bombillas rojas. La probabilidad de que una bombilla del contenedor no funcione es igual a 0,01 si la bombilla es blanca, es igual a 0,02 si la bombilla es azul y 0,03 si la bombilla es roja. Se elige al azar una bombilla del contenedor.

- a) Calcúlese la probabilidad de que la bombilla elegida no funcione.
- b) Sabiendo que la bombilla elegida no funciona, calcúlese la probabilidad de que dicha bombilla sea de color azul

(Junio 2009 - Opción B)

Problema 4.10.5 (2 puntos) En un cierto banco el 30% de los créditos concedidos son para vivienda, el 50% se destinan a las empresas y el 20% son para consumo. Se sabe además que de los créditos concedidos a vivienda, el 10% resultan impagados, de los créditos concedidos a empresas son impagados el 20% y de los créditos concedidos para consumo resultan impagados el 10%.

- a) Calcúlese la probabilidad de que un crédito elegido al azar sea pagado.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un crédito elegido al azar se haya destinado a consumo, sabiendo que se ha pagado?

(Septiembre 2009 - Opción A)

Problema 4.10.6 (2 puntos) La probabilidad de que un habitante de cierto pueblo de la Comunidad de Madrid le guste la música moderna es igual a 0,55; la probabilidad de que le guste la música clásica es igual a 0,40 y la probabilidad de que no le guste ninguna de las dos es igual a 0,25. Se elige al azar un habitante de dicho pueblo. Calcúlese la probabilidad de que le guste:

- a) al menos uno de los dos tipos de música.
- b) la música clásica y también la moderna.
- c) sólo la música clásica.
- d) sólo la música moderna.

(Septiembre 2009 - Opción B)

4.11. Año 2010

Problema 4.11.1 (2 puntos) Según un cierto estudio, el 40% de los hogares europeos tienen contratado acceso a internet, el 33% tiene contratada televisión por cable, y el 20% disponen de ambos servicios. Se selecciona un hogar europeo al azar.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo tenga contratada la televisión por cable?

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios?

(Modelo 2010 - Opción A)

Problema 4.11.2 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que:

$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}$$

Calcular:

$$P(A \cup B), \quad P(A \cap B), \quad P(\bar{A}|B), \quad P(\bar{B}|A)$$

(Modelo 2010 - Opción B)

Problema 4.11.3 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(A \cap B) = 0,1$. Calcúlense las siguientes probabilidades:

$$a)P(A \cup B); \quad b)P(\bar{A} \cup \bar{B}); \quad c)P(A|B); \quad d)P(\bar{A} \cap B)$$

(Junio 2010 - Opción A)

Problema 4.11.4 (2 puntos) Se dispone de un dado equilibrado de seis caras, que se lanza seis veces con independencia. Calcúlese la probabilidad de cada uno de los sucesos siguientes:

- Obtener al menos un seis en el total de los lanzamientos.
- Obtener un seis en el primer y último lanzamientos y en los restantes lanzamientos un número distinto de seis.

(Junio 2010 - Opción B)

Problema 4.11.5 (2 puntos) Sean tres sucesos A , B y C de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A|C) \geq P(B|C), \quad P(A|\bar{C}) \geq P(B|\bar{C})$$

Razónese cuál de las siguientes desigualdades es cierta:

$$a) P(A) < P(B); \quad b) P(A) \geq P(B)$$

Nota.- \bar{C} representa el suceso complementario de C .

(Septiembre 2010 - Opción A)

Problema 4.11.6 (2 puntos) Se consideran los siguientes sucesos:

- Suceso A =La economía de un cierto país está en recesión.

- Suceso B = Un indicador económico muestra que la economía de dicho país está en recesión.

Se sabe que:

$$P(A) = 0,005, \quad P(B|A) = 0,95, \quad P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,96$$

- Calcúlese la probabilidad de que el indicador económico muestre que la economía del país no está en recesión y además la economía del país esté en recesión.
- Calcúlese la probabilidad de que el indicador económico muestre que la economía del país está en recesión.

Nota.- La notación \bar{A} representa el suceso complementario de A .
(Septiembre 2010 - Opción B)

4.12. Año 2011

Problema 4.12.1 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que la probabilidad de que ambos ocurran simultáneamente es igual a $\frac{1}{6}$ y la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos es igual a $\frac{7}{12}$. Se sabe además que $P(A|B) = \frac{1}{2}$.

- Calcúlese la probabilidad de que ocurra A ó B .
- Calcúlese la probabilidad de que ocurra A .

(Modelo 2011 - Opción A)

Problema 4.12.2 (2 puntos) En una cierta población, la probabilidad de que un habitante elegido al azar siga una dieta de adelgazamiento es igual a 0,2. Entre los habitantes que siguen una dieta de adelgazamiento, la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar practique deporte regularmente es igual a 0,6. Entre los habitantes que no siguen dieta de adelgazamiento, la probabilidad de que uno de ellos elegido al azar practique deporte regularmente es igual a 0,3. Se elige al azar un habitante de la población.

- Calcúlese la probabilidad de que practique deporte regularmente.
- Si se sabe que dicho habitante practica deporte regularmente, ¿cuál es la probabilidad de que esté siguiendo una dieta de adelgazamiento?

(Modelo 2011 - Opción B)

Problema 4.12.3 (2 puntos) En un edificio inteligente dotado de sistemas de energía solar y eólica, se sabe que la energía suministrada cada día proviene de placas solares con probabilidad 0,4, de molinos eólicos con probabilidad 0,26 y de ambos tipos de instalaciones con probabilidad 0,12. Elegido un día al azar, calcúlese la probabilidad de que la energía sea suministrada al edificio:

- a) por alguna de las dos instalaciones,
- b) solamente por una de las dos.

(Junio 2011 - Opción A)

Problema 4.12.4 (2 puntos) En un cierto punto de una autopista está situado un radar que controla la velocidad de los vehículos que pasan por dicho punto. La probabilidad de que el vehículo que pase por el radar sea un coche es 0,5, de que sea un camión es 0,3 y de que sea una motocicleta es 0,2. La probabilidad de que cada uno de los tres tipos de vehículos supere al pasar por el radar la velocidad máxima permitida es 0,06 para un coche, 0,02 para un camión y 0,12 para una motocicleta. En un momento dado, un vehículo pasa por el radar.

- a) Calcúlese la probabilidad de que este vehículo supere la velocidad máxima permitida.
- b) Si el vehículo en cuestión ha superado la velocidad máxima permitida, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de una motocicleta?

(Junio 2011 - Opción B)

Problema 4.12.5 (2 puntos). Se supone que la probabilidad de que nazca una niña es 0,49 y la probabilidad de que nazca un niño es 0,51. Una familia tiene dos hijos.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean niños, condicionada porque el segundo sea niño?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean niños, condicionada porque al menos uno sea niño?

(Septiembre 2011 - Opción A)

Problema 4.12.6 (2 puntos). Se dispone de tres urnas, A , B y C . La urna A contiene 1 bola blanca y 2 bolas negras, la urna B contiene 2 bolas blancas y 1 bola negra y la urna C contiene 3 bolas blancas y 3 bolas negras. Se lanza un dado equilibrado y si sale 1, 2 o 3 se escoge la urna A , si sale el 4 se escoge la urna B y si sale 5 o 6 se elige la urna C . A continuación, se extrae una bola de la urna elegida.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?
- b) Si se sabe que la bola extraída ha sido blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la bola haya sido extraída de la urna C ?

(Septiembre 2011 - Opción B)

Problema 4.12.7 (*2 puntos*). La probabilidad de que el jugador A de baloncesto consiga una canasta de tres puntos es igual a $7/9$, y la probabilidad de que otro jugador B consiga una canasta de tres puntos es $5/7$. Cada uno de estos jugadores realiza un lanzamiento de tres puntos.

- a) Calcúlese la probabilidad de que solamente uno de los dos jugadores consiga un triple.
- b) Calcúlese la probabilidad de que al menos uno de los dos jugadores consiga un triple.

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción A)

Problema 4.12.8 (*2 puntos*). Los datos de la tabla siguiente se han extraído de las estadísticas oficiales de la prueba de acceso a estudios universitarios (fase general) de la convocatoria del curso 2009/2010, en el Distrito único de Madrid:

	Chico	Chica
Apto	12109	9863
NoApto	1717	1223

Se elige un alumno al azar de entre los que se presentaron a dicha prueba.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno elegido sea chica o haya resultado apto?
- b) Si el alumno elegido es chico, ¿Cuál es la probabilidad de que haya resultado no apto?

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción B)

4.13. Año 2012

Problema 4.13.1 (*2 puntos*) Una bolsa contiene dos monedas equilibradas. Una de las monedas tiene cara y cruz y la otra tiene dos caras. Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos veces consecutivas con independencia, observándose dos caras. ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda elegida sea la moneda de dos caras?

(Modelo 2012 - Opción A)

Problema 4.13.2 (2 puntos) Una escuela de natación ofrece cursos de iniciación y perfeccionamiento en las categorías pre-benjamín (7-8 años), benjamín (9-10 años) y alevín (11-12 años). La siguiente tabla contiene la información con el número de nadadores matriculados en cada curso:

	Pre – benjamín	Benjamín	Alevín	Total
Iniciación	120	70	10	200
Perfeccionamiento	40	90	150	280
Total	160	160	160	480

Se elige al azar un nadador de la escuela.

- ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el curso de iniciación?
- ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el curso de perfeccionamiento o bien sea alevín?
- Si el nadador elegido es un benjamín, ¿cuál es la probabilidad de que esté en el curso de perfeccionamiento?
- Si el nadador elegido está en el curso de iniciación, ¿cuál es la probabilidad de que sea benjamín?

(Modelo 2012 - Opción B)

Problema 4.13.3 (2 puntos) En un tribunal de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado se han examinado 80 alumnos del colegio A , 70 alumnos del colegio B y 50 alumnos del colegio C . La prueba ha sido superada por el 80 % de los alumnos del colegio A , el 90 % de los del colegio B y por el 82 % de los del colegio C .

- ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar haya superado la prueba?
- Un alumno elegido al azar no ha superado la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al colegio B ?

(Junio 2012 - Opción A)

Problema 4.13.4 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que:

$$P(A \cap B) = 0,1 \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,6 \quad P(A|B) = 0,5$$

Calcúlense:

- $P(B)$.
- $P(A \cup B)$.

- c) $P(A)$.
- d) $P(\overline{B}|\overline{A})$.

Nota: \overline{S} denota el suceso complementario del suceso S . $P(S|T)$ denota la probabilidad del suceso S condicionada al suceso T .

(Junio 2012 - Opción B)

Problema 4.13.5 (2 puntos) Una ferretería tiene en su almacén bombillas de bajo consumo: 500 bombillas de 20 W, 300 de 15 W y 200 de 12 W. Los controles de calidad realizados por la empresa que fabrica las bombillas han permitido determinar las probabilidades de fallo de cada tipo de producto durante la primera hora de encendido, siendo de 0,03 para las bombillas de 20 W, de 0,02 para las de 15 W y de 0,01 para las bombillas de 12 W.

- a) Se elige al azar una bombilla del almacén, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un fallo durante la primera hora de encendido?
- b) Se somete al control de calidad una bombilla del almacén elegida al azar y falla en su primera hora de encendido, ¿cuál es la probabilidad de que sea una bombilla de 20 W?

(Junio 2012(coincidente) - Opción A)

Problema 4.13.6 (2 puntos) Los 30 alumnos de una Escuela de Idiomas estudian obligatoriamente Inglés y Francés. En las pruebas finales de estas materias se han obtenido los siguientes resultados: 18 han aprobado Inglés, 14 han aprobado Francés y 6 han aprobado los dos idiomas.

- a) Se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya aprobado ni Inglés ni Francés?
- b) Se elige un estudiante al azar de entre los aprobados de Francés, ¿cuál es la probabilidad de que también haya aprobado Inglés?

(Junio 2012(coincidente) - Opción B)

Problema 4.13.7 (2 puntos) Se dispone de cinco cajas opacas. Una contiene una bola blanca, dos contienen una bola negra y las otras dos están vacías. Un juego consiste en ir seleccionando al azar y secuencialmente una caja no seleccionada previamente hasta obtener una que contenga una bola. Si la bola de la caja seleccionada es blanca, el jugador gana; si es negra, el jugador pierde.

- a) Calcúlese la probabilidad de que el jugador gane.
- b) Si el jugador ha perdido, ¿cuál es la probabilidad de que haya seleccionado una sola caja?

(Septiembre 2012 - Opción A)

Problema 4.13.8 (2 puntos) Se consideran dos sucesos A y B tales que:

$$P(A) = \frac{1}{3} \quad P(B|A) = \frac{1}{4} \quad P(A \cup B) = \frac{1}{2}$$

Calcúlese razonadamente:

- a) $P(A \cap B)$.
- b) $P(B)$.
- c) $P(\bar{B}|A)$.
- d) $P(\bar{A}|\bar{B})$.

Nota: \bar{S} denota el suceso complementario del suceso S . $P(S|T)$ denota la probabilidad del suceso S condicionada al suceso T .

(Septiembre 2012 - Opción B)

4.14. Año 2013

Problema 4.14.1 (2 puntos) Tres máquinas A , B y C fabrican tornillos del mismo tipo. La probabilidad de que un tornillo fabricado en la máquina A sea defectuoso es 0,01, de que lo sea uno fabricado en B es 0,02 y de que lo sea si ha sido manufacturado en C es 0,03. En una caja se mezclan 120 tornillos: 15 de la máquina A , 30 de la B y 75 de la C .

- a) Calcúlese la probabilidad de que un tornillo elegido al azar no sea defectuoso.
- b) Elegido un tornillo al azar resulta defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B ?

(Modelo 2013 - Opción A)

Problema 4.14.2 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(\bar{B}) = \frac{3}{4}, \quad P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

- a) Determínese si son compatibles o incompatibles los sucesos A y B .
- b) Determínese si son dependientes o independientes los sucesos A y B .

Nota: \bar{S} denota al suceso complementario del suceso S .

(Modelo 2013 - Opción B)

Problema 4.14.3 (2 puntos) Al analizar las actividades de ocio de un grupo de trabajadores fueron clasificados como deportistas o no deportistas y como lectores o no lectores. Se sabe que el 55 % de los trabajadores se clasificaron como deportistas o lectores, el 40 % como deportistas y el 30 % lectores. Se elige un trabajador al azar:

- a) Calcúlese la probabilidad de sea deportista y no lector.
- b) Sabiendo que el trabajador elegido es lector, calcúlese la probabilidad de que sea deportista.

(Junio 2013 - Opción A)

Problema 4.14.4 (2 puntos) Una tienda de trajes de caballero trabaja con tres sastres. Un 5 % de los clientes atendidos por el sastre A no queda satisfecho, tampoco el 8 % de los atendidos por el sastre B ni el 10 % de los atendidos por el sastre C . El 55 % de los arreglos se encargan al sastre A , el 30 % al B y el 15 % restante al C . Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Un cliente no quede satisfecho con el arreglo.
- b) Si un cliente no ha quedado satisfecho, le haya hecho el arreglo el sastre A

(Junio 2013 - Opción B)

Problema 4.14.5 (2 puntos) En un instituto se imparten únicamente dos lenguas extranjeras: inglés y francés. El 72 % de los alumnos de ese instituto estudia inglés y el 42 % estudia francés. Todos los alumnos estudian al menos una lengua extranjera. Si se elige un alumno al azar, calcúlese la probabilidad de que:

- a) Estudie inglés y francés.
- b) Estudie inglés, y no estudie francés.

(Junio 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 4.14.6 (2 puntos)

- a) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ y $P(A \cup B) = 0,8$, determínese la probabilidad de A condicionado a que B haya ocurrido.
- b) Sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que $P(C) = 0,4$, $P(D) = 0,5$ y que C y D son incompatibles, determínese $P(C \cup D)$.

(Junio 2013 (coincidente)- Opción B)

Problema 4.14.7 (2 puntos) En un avión de línea regular existe clase turista y clase preferente. La clase turista ocupa las dos terceras partes del pasaje y la clase preferente el resto. Se sabe que todos los pasajeros que viajan en la clase preferente saben hablar inglés y que el 40 % de los pasajeros que viajan en clase turista no saben hablar inglés. Se elige un pasajero del avión al azar.

- Calcúlese la probabilidad de que el pasajero elegido sepa hablar inglés.
- Si se observa que el pasajero elegido sabe hablar inglés, ¿cuál es la probabilidad de que viaje en la clase turista?

(Septiembre 2013 - Opción A)

Problema 4.14.8 (2 puntos) Una caja de caramelos contiene 7 caramelos de menta y 10 de fresa. Se extrae al azar un caramelo y se sustituye por dos del otro sabor. A continuación se extrae un segundo caramelo. Hállese la probabilidad de que:

- El segundo caramelo sea de fresa.
- El segundo caramelo sea del mismo sabor que el primero.

(Septiembre 2013 - Opción B)

Problema 4.14.9 (2 puntos) Se consideran los sucesos A y B de un experimento aleatorio tales que

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(B) = \frac{2}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

- Determinese la probabilidad de que suceda A si sabemos que ha sucedido B .
- Determinese la probabilidad de que no suceda ni A ni B .

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 4.14.10 (2 puntos) En un avión viajan un 10 % de los pasajeros en primera clase. Del total de pasajeros del avión un 20 % son mujeres. Se sabe que los pasajeros que viajan en primera clase y además son mujeres, son el 2 % del total. Determinese la probabilidad de que:

- al escoger un pasajero de primera clase al azar sea mujer.
- al escoger un varón del avión al azar, no viaje en primera clase.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción B)

4.15. Año 2014

Problema 4.15.1 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio, tales que la probabilidad de que no ocurra B es 0,6. Si el suceso B ocurre, entonces la probabilidad de que el suceso A ocurra es de 0,4 y si el suceso A ocurre, la probabilidad de que el suceso B ocurra es 0,25. Calcúlense:

a) $P(B)$, b) $P(A \cap B)$, c) $P(A)$, d) $P(A \cup B)$
(Modelo 2014 - Opción A)

Problema 4.15.2 (2 puntos) En una determinada población, el 30% de las personas que deciden iniciar una dieta de adelgazamiento utilizan algún tipo de supervisión médica mientras que el 40% de todas las personas que inician una dieta de adelgazamiento continúan con ella al menos un mes. En esa población, el 80% de las personas que inician la dieta sin supervisión abandona antes del primer mes.

- Se escoge al azar a un individuo de esa población del que sabemos que ha iniciado una dieta. ¿Cuál es la probabilidad de que abandonara antes del primer mes y no hubiera tenido supervisión médica?
- ¿Qué porcentaje de las personas que inician una dieta con supervisión médica abandona antes del primer mes?

(Modelo 2014 - Opción B)

Problema 4.15.3 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral tales que: $P(A) = 0,4$; $P(A \cup B) = 0,5$; $P(B|A) = 0,5$. Calcúlense:

- $P(B)$.
- $P(A|\bar{B})$.

Nota: \bar{S} denota al suceso complementario del suceso S .
(Junio 2014 - Opción A)

Problema 4.15.4 (2 puntos) Se dispone de un dado cúbico equilibrado y dos urnas A y B . La urna A contiene 3 bolas rojas y 2 negras; la urna B contiene 2 rojas y 3 negras. Lanzamos el dado: si el número obtenido es 1 ó 2 extraemos una bola de la urna A ; en caso contrario extraemos una bola de la urna B .

- ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola roja?
- Si la bola extraída es roja, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la urna A ?

(Junio 2014 - Opción B)

Problema 4.15.5 (2 puntos) Todos los trabajadores de una determinada empresa tienen como mínimo conocimientos de Inglés o de Alemán. El 75 % de los empleados tienen conocimientos de Inglés y el 46 % conocimientos de Alemán. Calcúlese la probabilidad de que un empleado elegido al azar:

- a) Tenga conocimientos de Inglés y de Alemán.
- b) Tenga conocimientos de Inglés si sabemos que tiene conocimientos de Alemán.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 4.15.6 (2 puntos) En un estudio de arquitectura de Madrid trabajan personas de diferentes nacionalidades. El 80 % de las personas que trabajan en el estudio son españolas. El 40 % de los empleados del estudio son mujeres, de las cuales un 90 % son españolas. Calcúlese la probabilidad de que tomando a un empleado del estudio de arquitectura al azar:

- a) Sea mujer y extranjera.
- b) Sea español sabiendo que no es mujer.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción B)

Problema 4.15.7 (2 puntos) En la representación de navidad de los alumnos de 3º de primaria de un colegio hay tres tipos de papeles: 7 son de animales, 3 de personas y 12 de árboles. Los papeles se asignan al azar, los alumnos escogen por orden alfabético sobres cerrados en los que está escrito el papel que les ha correspondido.

- a) Calcúlese la probabilidad de que a los dos primeros alumnos les toque el mismo tipo de papel.
- b) Calcúlese la probabilidad de que el primer papel de persona le toque al tercer alumno de la lista.

(Septiembre 2014 - Opción A)

Problema 4.15.8 (2 puntos) Al 80 % de los trabajadores en educación (E) que se jubilan sus compañeros les hacen una fiesta de despedida (FD), también al 60 % de los trabajadores de justicia (J) y al 30 % de los de sanidad (S). En el último año se jubilaron el mismo número de trabajadores en educación que en sanidad, y el doble en educación que en justicia.

- a) Calcúlese la probabilidad de que a un trabajador de estos sectores, que se jubiló, le hicieran una fiesta.

- b) Sabemos que a un trabajador jubilado elegido al azar de entre estos sectores, no le hicieron fiesta. Calcúlese la probabilidad de que fuera de sanidad.

(Septiembre 2014 - Opción B)

Problema 4.15.9 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio, tales que $P(A) = P(A|B) = 0,25$ y $P(B|A) = 0,5$.

- a) Estúdiense si los sucesos son independientes.
b) Calcúlese $P(A \cup B)$

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 4.15.10 (2 puntos) Se ha cometido un delito. La probabilidad de que lo haya cometido un varón es el doble de que lo haya cometido una mujer. Por otra parte, la probabilidad de que al examinar un área determinada de la huella dactilar de un varón se encuentren 15 crestas es 0,26, mientras que en una mujer es 0,04.

- a) Calcúlese la probabilidad de que una huella encontrada en la escena del delito tenga 15 crestas en el recuento de dicha área.
b) Se ha encontrado en la escena del delito una huella dactilar con 15 crestas en esa área determinada. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha huella pertenezca a un varón?

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción B)

4.16. Año 2015

Problema 4.16.1 (2 puntos) Se consideran los sucesos incompatibles A y B de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$. Calcúlese:

- a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
b) $P(B \cap \bar{A})$

Nota: \bar{S} denota al suceso complementario del suceso S .
(Modelo 2015 - Opción A)

Problema 4.16.2 (2 puntos) Una urna contiene 5 bolas blancas y 4 negras, y otra urna contiene 3 bolas blancas y dos negras. Se toma al azar una bola de la primera urna y, sin mirarla, se introduce en la segunda urna. A continuación extraemos consecutivamente, con reemplazamiento, dos bolas de la segunda urna. Hállese la probabilidad de que las dos últimas bolas extraídas sean:

- a) Del mismo color.
- b) De distinto color.

(Modelo 2015 - Opción B)

Problema 4.16.3 (2 puntos) En una bolsa hay cuatro bolas rojas y una verde. Se extraen de forma consecutiva y sin reemplazamiento dos bolas. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Las dos bolas sean del mismo color.
- b) La primera bola haya sido verde si la segunda bola extraída es roja.

(Junio 2015 - Opción A)

Problema 4.16.4 (2 puntos) Sean A y B sucesos de un experimento aleatorio tales que $P(A \cap B) = 0,3$; $P(A \cap \bar{B}) = 0,2$; $P(B) = 0,7$. Calcúlese:

- a) $P(A \cup B)$:
- b) $P(B|\bar{A})$.

Nota: \bar{S} denota al suceso complementario del suceso S .

(Junio 2015 - Opción B)

Problema 4.16.5 (2 puntos) En cierto ensayo clínico, se trata al 60 % de pacientes afectados de hepatitis C con interferón, y al 40 % restante con ribavirina más interferón. Al cabo de ocho semanas se observa una respuesta favorable al tratamiento en el 43 % de los pacientes tratados únicamente con interferón y en el 71 % de los pacientes tratados con ribavirina más interferón. Se toma al azar un paciente del ensayo. Determínese la probabilidad de que:

- a) Haya respondido favorablemente al tratamiento que está recibiendo.
- b) Si ha respondido favorablemente al tratamiento, haya sido tratado únicamente con interferón.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 4.16.6 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral tales que $P(A) = 0,8$; $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,8$ y $P(A \cup B) = 0,9$.

- a) ¿Son independientes los sucesos A y B ?
- b) Calcúlese $P(B|\bar{A})$.

Nota: \bar{S} denota el suceso complementario del suceso S .

(Junio 2015 (coincidente)- Opción B)

Problema 4.16.7 (2 puntos) Se consideran los sucesos A , B y C de un experimento aleatorio tales que: $P(A) = 0,09$; $P(B) = 0,07$ y $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,97$. Además los sucesos A y C son incompatibles.

- a) Estúdiese si los sucesos A y B son independientes.
- b) Calcúlese $P(A \cap B|C)$.

Nota: \overline{S} denota al suceso complementario del suceso S . (Septiembre 2015 - Opción A)

Problema 4.16.8 (2 puntos) La probabilidad de que un trabajador llegue puntual a su puesto de trabajo es $3/4$. Entre los trabajadores que llegan tarde, la mitad va en transporte público. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Un trabajador elegido al azar llegue tarde al trabajo y vaya en transporte público.
- b) Si se eligen tres trabajadores al azar, al menos uno de ellos llegue puntual. Supóngase que la puntualidad de cada uno de ellos es independiente de la del resto.

(Septiembre 2015 - Opción B)

4.17. Año 2016

Problema 4.17.1 (2 puntos) En un polígono industrial se almacenan 30000 latas de refresco procedentes de las fábricas A , B y C a partes iguales. Se sabe que en 2016 caducan 1800 latas de la fábrica A , 2400 procedentes de la B y 3000 que proceden de la fábrica C .

- a) Calcúlese la probabilidad de que una lata elegida al azar caduque en 2016.
- b) Se ha elegido una lata de refresco aleatoriamente y caduca en 2016, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la fábrica A ?

(Modelo 2016 - Opción A)

Problema 4.17.2 (2 puntos) Las probabilidades de que cinco jugadores de baloncesto encesten un lanzamiento de tiro libre son, respectivamente, de 0,8; 0,9; 0,7; 0,9; 0,93. Si cada jugador lanza un tiro libre siguiendo el orden anterior y considerando los resultados de los lanzamientos como sucesos independientes, calcúlese la probabilidad de que:

- a) Todos los jugadores encesten su tiro libre.

- b) Al menos uno de los tres primeros jugadores enceste.

(Modelo 2016 - Opción B)

Problema 4.17.3 (2 puntos) Una conocida orquesta sinfónica está compuesta por un 55% de varones y un 45% de mujeres. En la orquesta un 30% de los instrumentos son de cuerda. Un 25% de las mujeres de la orquesta interpreta un instrumento de cuerda. Calcúlese la probabilidad de que un intérprete de dicha orquesta elegido al azar:

- a) Sea una mujer si se sabe que es intérprete de un instrumento de cuerda.
b) Sea intérprete de un instrumento de cuerda y sea varón.

(Junio 2016 - Opción A)

Problema 4.17.4 (2 puntos) Tenemos dos urnas A y B . La urna A contiene 5 bolas: 3 rojas y 2 blancas. La urna B contiene 6 bolas: 2 rojas y 4 blancas. Se extrae una bola al azar de la urna A y se deposita en la urna B . Seguidamente se extrae una bola al azar de la urna B . Calcúlese la probabilidad de que:

- a) La segunda bola extraída sea roja.
b) Las dos bolas extraídas sean blancas.

(Junio 2016 - Opción B)

Problema 4.17.5 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos independientes de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0,5$ y $P(\bar{B}) = 0,8$. Calcúlese:

- a) $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.
b) $P(\bar{A}|\bar{B})$.

Nota: \bar{S} denota el suceso complementario del suceso S . (Junio 2016 - Opción A (Coincidentes))

Problema 4.17.6 (2 puntos) En cierta población animal tratada genéticamente, el número de hembras es el doble que el número de machos. Se observa que el 6% de los machos de esa población padece albinismo, mientras que entre las hembras únicamente el 3% padece albinismo. Calcúlese la probabilidad de que un individuo de esa población elegido al azar:

- a) Padezca albinismo.
b) Sea hembra, en el supuesto de que padezca albinismo.

(Junio 2016 - Opción B (Coincidentes))

Problema 4.17.7 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que $P(A) = 3/4$, $P(A|B) = 3/4$ y $P(B|A) = 1/4$.

- a) Demuéstrese que A y B son sucesos independientes pero no incompatibles.
- b) Calcúlese $P(\bar{A}|\bar{B})$.
Nota: \bar{S} denota el suceso complementario del suceso S .

(Septiembre 2016 - Opción A)

Problema 4.17.8 (2 puntos) Para efectuar cierto diagnóstico, un hospital dispone de dos escáneres, a los que denotamos como A y B . El 65% de las pruebas de diagnóstico que se llevan a cabo en ese hospital se realizan usando el escáner A , el resto con el B . Se sabe además que el diagnóstico efectuado usando el escáner A es erróneo en un 5% de los casos, mientras que el diagnóstico efectuado usando el escáner B es erróneo en un 8% de los casos. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) El diagnóstico de esa prueba efectuado a un paciente en ese hospital sea erróneo.
- b) El diagnóstico se haya efectuado usando el escáner A , sabiendo que ha resultado erróneo.

(Septiembre 2016 - Opción B)

www.musat.net

Capítulo 5

Estadística

5.1. Año 2000

Problema 5.1.1 (2 puntos) Se sabe que el peso en kilogramos de los alumnos de bachillerato de Madrid, es una variable aleatoria X que sigue una distribución normal de desviación típica igual a 5 kg.

- En caso de considerar muestras de 25 alumnos, ¿qué distribución tiene la variable aleatoria media muestral \bar{X} ?
- Si se desea que la media de la muestra no difiera en más de 1 kg de la media de la población, con probabilidad 0,95; ¿cuántos alumnos se deberían tomar en la muestra?

(Modelo 2000 - Opción A)

Problema 5.1.2 (2 puntos) Se sabe por experiencia que el tiempo obtenido por los participantes olímpicos de la prueba de 100 metros, en la modalidad de Decathlon, es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media 12 segundos y desviación típica 1,5 segundos. Para contrastar, con un nivel de significación de 5%, si no ha variado el tiempo medio en la última Olimpiada, se extrajo una muestra aleatoria de 10 participantes y se anotó el tiempo obtenido por cada uno, con los resultados siguientes, en segundos:

13 12 11 10 11 11 9 10 12 11

- ¿Cuáles son la hipótesis nula y la alternativa del contraste?
- Determinése la región crítica.
- Realícese el contraste.

(Modelo 2000 - Opción B)

Problema 5.1.3 (2 puntos) En una comunidad autónoma se estudia el número medio de hijos a partir de los datos disponibles en cada municipio. Se supone que este número sigue una distribución normal con desviación típica igual a 0,08. El valor medio de estos datos para 36 municipios resulta ser igual a 1,17 hijos por mujer. Se desea contrastar, con un nivel de significación de 0,01, si el número medio de hijos por mujer en la comunidad es de 1,25. (Junio 2000 - Opción A)

Problema 5.1.4 (2 puntos) Una variable aleatoria X tiene distribución normal, siendo su desviación típica igual a 3.

- Si se consideran muestras de tamaño 16, ¿qué distribución sigue la variable aleatoria media muestral?
- Si se desea que la media de la muestra no difiera en más de 1 unidad de la media de la población, con probabilidad de 0,99, ¿cuántos elementos, como mínimo, se deberían tomar en la muestra?

(Junio 2000 - Opción B)

Problema 5.1.5 (2 puntos) El número de reclamaciones presentadas durante la campaña de Navidad en 9 tiendas de una empresa ha sido:

25 31 28 30 32 20 22 34 30

Se acepta que estos números de reclamaciones sigue una distribución normal con desviación típica igual a 5. Se desea contrastar si el número de reclamaciones es 26, con un nivel de significación de 0,05.

- Plantéese cuáles son la hipótesis nula y la alternativa de contraste.
- Determinese la región crítica de contraste.
- ¿Es posible aceptar la hipótesis con el nivel de significación indicado?

(Septiembre 2000 - Opción A)

Problema 5.1.6 (2 puntos) Se supone que los gastos corrientes de los empleados de los distintos departamentos de una empresa siguen una distribución normal con desviación típica de 300 euros.

De los datos disponibles para 16 departamentos se ha obtenido un gasto medio por empleado de 2750 euros. Determinese un intervalo de confianza al 99% para el gasto corriente medio por empleado en la empresa.

(Septiembre 2000 - Opción B)

5.2. Año 2001

Problema 5.2.1 (2 puntos) Un investigador afirma que las horas de vuelo de cierto tipo de aviones comerciales se distribuye normalmente, con una media de 200000 horas y una desviación típica de 20000 horas. Para comprobar la veracidad de sus hipótesis, obtuvo una muestra aleatoria de 4 aviones de distintas compañías aéreas, fuera ya de servicio, y anotó el número de horas de vuelo de cada uno, resultando los siguientes datos (en miles de horas):

150 320 270 140

- Plantéese cuáles son la hipótesis nula y la alternativa de contraste.
- Realícese el contraste con un nivel de significación del 5%.

(Modelo 2001 - Opción A)

Problema 5.2.2 (2 puntos) El tiempo de vida de una clase de depuradoras de agua utilizadas en una planta industrial se distribuye normalmente, con una desviación típica de 2000 horas. En un ensayo realizado con una muestra aleatoria de 9 depuradoras, se obtubieron los siguientes tiempos de vida en miles de horas

9,5 10 7,5 10,5 16,5 10 12 32 18

- Hállese un intervalo de confianza al 99% para la vida media de las depuradoras.
- Cáculese el tamaño mínimo que debería tener la muestra, en el caso de admitir un error máximo de 500 horas, con un grado de confianza del 95%:

(Modelo 2001 - Opción B)

Problema 5.2.3 (2 puntos) Un establecimiento vende paquetes de carbón para barbacoa de peso teórico 10 kg. Se supone que el peso de los paquetes sigue una distribución normal con desviación típica 1 kg. Para contrastar la citada hipótesis, frente a que el peso teórico sea distinto de 10 kg, se escogen al azar 4 paquetes que pesan en kilogramos, respectivamente:

8 10 9 8

Se desea que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, cuando esta es cierta, sea 0,95. Se pide:

- La región crítica de contraste.
- ¿Se debe rechazar la hipótesis nula?

(Junio 2001 - Opción A)

Problema 5.2.4 (2 puntos) Se supone que el peso de las sandías de cierta variedad sigue una distribución normal con desviación típica de 1 kg. Se toma una muestra aleatoria de 100 sandías y se observa que el peso medio es de 6 kg.

- a) Calcúlese un intervalo de confianza al 95 % para el peso medio de esa variedad de sandía.
- b) ¿Puede aceptarse la hipótesis de que el verdadero peso medio de las sandías es de 5 kg, frente a que sea diferente, con un nivel de significación de 0,05?

(Junio 2001 - Opción B)

Problema 5.2.5 (2 puntos) El peso de los perros adultos de cierta raza es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con desviación típica 0,6 kg. Una muestra aleatoria de 30 animales ha dado un peso medio de 7,4 kg.

- a) Calcúlese un intervalo de confianza al 99 % para el peso medio de los perros adultos de esta raza.
- b) ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra para tener una confianza del 95 % de que la media muestral no se diferencie en más de 0,3 kg de la media de la población?

(Septiembre 2001 - Opción A)

Problema 5.2.6 (2 puntos) En un laboratorio se obtubieron seis determinaciones del PH de una solución, con los resultados siguientes:

7,91 7,94 7,90 7,93 7,89 7,91

Se supone que la población de todas las determinaciones de PH de la solución tiene una distribución normal de media desconocida con una desviación típica igual a 0,02.

- a) Determinése un intervalo de confianza al 98 % para la media de todas las determinaciones del PH de la misma solución obtenidas con el mismo método.
- b) Con el mismo nivel de confianza anterior, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que la amplitud del intervalo de confianza sea a lo sumo 0,02?

(Septiembre 2001 - Opción B)

5.3. Año 2002

Problema 5.3.1 (2 puntos) El peso de individuos de cierta especie se distribuye como una variable aleatoria normal con media 50 euros y desviación típica 4.

- Calcular la probabilidad de que la media muestral obtenida con los valores de 16 individuos seleccionados aleatoriamente, esté entre 48 y 50.
- Se seleccionan aleatoriamente 4 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra supere el valor 54?

(Modelo 2002 - Opción A)

Problema 5.3.2 (2 puntos) Una investigación sobre el servicio post-venta para clientes que adquirieron cierta marca de automóviles, presenta los siguientes datos sobre una muestra de 608 clientes: 371 están muy satisfechos frente a los 45 que se declaran muy insatisfechos.

- A nivel de significación del 5%, ¿se puede concluir que la proporción de clientes muy satisfechos es superior al 60%?
- Explicar el error de Tipo I de este contraste. ¿Con qué probabilidad se comete el error?

(Modelo 2002 - Opción B)

Problema 5.3.3 (2 puntos) Se quiere comprobar si una máquina destinada al llenado de envases de agua mineral ha sufrido desajuste. Una muestra aleatoria de diez envases de esta máquina ha proporcionado los siguientes resultados:

0,49, 0,52, 0,51, 0,48, 0,53, 0,55, 0,49, 0,50, 0,52, 0,49

Suponiendo que la cantidad de agua mineral que este tipo de máquinas deposita en cada envase sigue una distribución normal de media 0,5 litros y una desviación típica de 0,02 litros, se desea contrastar si el contenido medio de los envases de esta máquina es de 0,5 litros, con un nivel de significación del 5%.

- Plantear la hipótesis nula y la alternativa de contraste.
- Determinar la región crítica del contraste.
- Realizar el contraste.

(Junio 2002 - Opción A)

Problema 5.3.4 (2 puntos) La duración de las llamadas de teléfono, en una oficina comercial, sigue una distribución normal con desviación típica 10 segundos. Se hace una encuesta entre 50 llamadas y la media de duración obtenida en esa muestra es de 35 segundos. Calcular un intervalo de confianza al 95 % para la duración media de las llamadas.
(Junio 2002 - Opción B)

Problema 5.3.5 (2 puntos) Los depósitos mensuales, en euros, de una entidad bancaria, siguen una distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 5,1$. Con el fin de contrastar si la media de los depósitos mensuales es 20 euros, se toma una muestra de tamaño 16, resultando ser la media muestral de 22,4 euros. ¿Se puede aceptar la hipótesis de que la media es 20 a un nivel de significación del 5 %?.
(Septiembre 2002 - Opción A)

Problema 5.3.6 (2 puntos) De una población con distribución normal de media 50 y desviación típica 6, se extrae una muestra aleatoria de tamaño n y se calcula su media muestral.

- ¿Qué valor debe de tener n para que se cumpla la desigualdad $|\bar{X} - \mu| < 2$, con un probabilidad de 0,95?
- Resolver el apartado anterior con un probabilidad de 0,90. Comparar ambos resultados.

(Septiembre 2002 - Opción B)

5.4. Año 2003

Problema 5.4.1 (2 puntos) Se estima que el tiempo de reacción de un conductor ante un obstáculo imprevisto tiene una distribución normal con desviación típica 0,05 segundos. Si se quiere conseguir que el error de estimación de la media no supere 0,01 segundos con un nivel de confianza del 99 %, ¿qué tamaño mínimo ha de tener la muestra de tiempos de reacción?
(Junio 2003 - Opción A)

Problema 5.4.2 (2 puntos) Se probaron 10 automóviles, escogidos aleatoriamente de una misma marca y modelo, por conductores con la misma forma de conducir y en carreteras similares. Se obtuvo que el consumo medio de gasolina, en litros, por cada 100 kilómetros fue de 6,5. Estudios previos indican que el consumo de gasolina tiene una distribución normal de desviación típica 2 litros. Determinar un intervalo de confianza al 95 % para la media del consumo de gasolina de estos automóviles.
(Junio 2003 - Opción B)

Problema 5.4.3 (2 puntos) El tiempo de conexión a Internet de los alumnos de cierta universidad, sigue una distribución normal con desviación típica 15 minutos. Para estimar la media del tiempo de conexión, se quiere calcular un intervalo de confianza que tenga una amplitud menor o igual que 6 minutos, con un nivel de confianza del 95 %. Determinar cuál es el tamaño mínimo de la muestra que es necesario observar.
(Septiembre 2003 - Opción A)

Problema 5.4.4 (2 puntos) Se ha extraído una muestra de 150 familias de residentes en un barrio obteniéndose que la renta familiar media de la misma asciende a 20000 euros. Se supone que la renta familiar de los residentes en el barrio sigue una distribución normal de desviación típica 150 euros.

- a) A partir de estos datos, calcular un intervalo de confianza para la renta familiar media con un nivel de confianza del 95 %.
- b) ¿Qué tamaño muestral mínimo es necesario para conseguir, con un nivel de confianza del 90 %, un error en la estimación de la renta familiar media no superior a ± 142 euros?

(Septiembre 2003 - Opción B)

5.5. Año 2004

Problema 5.5.1 (2 puntos) Se supone que los ingresos diarios en una empresa siguen una distribución normal con media 400 euros y desviación típica 250 euros.

- a) ¿Cómo se distribuye la media muestral, para muestras de tamaño n ?
- b) Se dispone de una muestra aleatoria de 25 observaciones. Calcular la probabilidad de que el promedio de ingresos esté entre 350 y 450 euros.

(Modelo 2004 - Opción A)

Problema 5.5.2 (2 puntos) El salario de los trabajadores de una ciudad sigue una distribución normal con desviación típica 15 euros. Se quiere calcular un intervalo de confianza para el salario medio, con un nivel de confianza del 95 %. Determinar cuál es el tamaño mínimo de la muestra que se necesitaría recoger para que el intervalo de confianza tenga una amplitud de 6 euros.

(Modelo 2004 - Opción B)

Problema 5.5.3 (2 puntos) En un servicio de atención al cliente, el tiempo de espera hasta recibir atención es una variable normal de media 10 minutos y desviación típica 2 minutos. Se toman muestras aleatorias del tiempo de espera de los clientes que llegan en un día concreto. Se pide:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 clientes no supere los 9 minutos.
- b) ¿Cuál es la distribución de la media muestral, si se toman muestras aleatorias de 64 clientes?. Especificar sus parámetros.

(Junio 2004 - Opción A)

Problema 5.5.4 (2 puntos) El precio de ciertos electrodomésticos puede considerarse como una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 100 euros. Los precios en euros correspondientes a una muestra de 9 de estos electrodomésticos son

255 85 120 290 80 80 275 290 135

- a) Construir un intervalo de confianza al 98 % para la media poblacional.
- b) Hallar el tamaño mínimo que debe tener la muestra, para que con un nivel de confianza del 99 %, el error de estimación del precio no supere los 50 euros

(Junio 2004 - Opción B)

Problema 5.5.5 (2 puntos) Una muestra aleatoria de 9 tarrinas de helado proporciona los siguientes pesos en gramos 88, 90, 90, 86, 87, 88, 91, 92, 89.

Hallar un intervalo de confianza al 95 % para la media de la población, sabiendo que el peso de las tarrinas tiene una distribución normal con una desviación típica de 1,8 gramos.

(Septiembre 2004 - Opción A)

Problema 5.5.6 (2 puntos) Calcular el tamaño mínimo que debe de tener una muestra aleatoria para garantizar que, en la estimación de la media de una población normal con varianza igual a 60, al 90 % de confianza, el error de estimación cometido no sea superior a 3 unidades.

(Septiembre 2004 - Opción B)

5.6. Año 2005

Problema 5.6.1 (2 puntos) El número de días de ausencia en el trabajo de los empleados de cierta empresa para un período de seis meses, se puede aproximar mediante una distribución normal de desviación típica 1,5 días. Una muestra aleatoria de diez empleados ha proporcionado los siguientes datos

5 4 6 8 7 4 2 7 6 1

- a) Determinar un intervalo de confianza al 90 % para el número medio de días que los empleados de esa empresa han faltado durante los seis últimos meses.
- b) ¿Qué tamaño debe tener la muestra para que el error máximo de la estimación sea de 0,5 días, con el mismo nivel de confianza?

(Modelo 2005 - Opción A)

Problema 5.6.2 (2 puntos) La temperatura corporal en una cierta especie animal es una variable aleatoria que tiene una distribución normal de media $36,7^{\circ}\text{C}$ y desviación típica $3,8^{\circ}\text{C}$. Se elige aleatoriamente una muestra de 100 ejemplares de esa especie. Hallar la probabilidad de que la temperatura corporal media de la muestra:

- a) Sea menor o igual a $36,9^{\circ}\text{C}$.
- b) Esté comprendida entre $36,5^{\circ}\text{C}$ y $37,3^{\circ}\text{C}$.

(Modelo 2005 - Opción B)

Problema 5.6.3 (2 puntos) En una encuesta se pregunta a 10.000 personas cuántos libros lee al año, obteniéndose una media de 5 libros. Se sabe que la población tiene una distribución normal con desviación típica 2.

- a) Hallar un intervalo de confianza al 80 % para la media poblacional.
- b) Para garantizar un error de estimación de la media poblacional no superior a 0,25 con un nivel de confianza del 95 %, ¿a cuántas personas como mínimo sería necesario entrevistar?

(Junio 2005 - Opción A)

Problema 5.6.4 (2 puntos) Para una población $N(\mu, \sigma = 25)$, ¿qué tamaño muestral mínimo es necesario para estimar μ mediante un intervalo de confianza, con un error menor o igual que 5 unidades, y con una probabilidad mayor o igual que 0,95?

(Junio 2005 - Opción B)

Problema 5.6.5 (2 puntos) La duración de las baterías de un determinado modelo de teléfono móvil tiene una distribución normal de media 34.5 horas y una desviación típica de 6.9 horas. Se toma una muestra aleatoria simple de 36 teléfonos móviles.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración media de las baterías de la muestra este comprendida entre 32 y 33.5 horas?.
- b) ¿Y de que sea mayor de 38 horas?.

(Septiembre 2005 - Opción A)

Problema 5.6.6 (2 puntos) El tiempo de reacción de una alarma electrónica ante un fallo del sistema es una variable aleatoria normal con desviación típica 1 segundo. A partir de una muestra de 100 alarmas se ha estimado la media poblacional del tiempo de reacción, mediante un intervalo de confianza, con un error máximo de estimación igual a 0.2 segundos. ¿Con qué nivel de confianza se ha realizado la estimación?.

(Septiembre 2005 - Opción B)

5.7. Año 2006

Problema 5.7.1 (2 puntos) El tiempo de conexión a Internet de los clientes de un cibercafé tiene una distribución normal de media μ y desviación típica 1,2 horas. Una muestra de 40 clientes ha dado como resultado una media de tiempo de conexión de 2,85 horas. Se pide:

- Determinar un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- Calcular el tamaño mínimo que debería tener la muestra para estimar la media de tiempo diario de conexión a Internet de los clientes de ese cibercafé, con un error menor o igual que 0,25 horas y una probabilidad de 0,95.

(Modelo 2006 - Opción A)

Problema 5.7.2 (2 puntos) Un fabricante de automóviles afirma que los coches de un cierto modelo tienen un consumo por cada 100 kilómetros que se puede aproximar por una distribución normal con desviación típica 0,68 litros. Se observa una muestra aleatoria simple de 20 coches del citado modelo y se obtiene una media de consumo de 6,8 litros. Determinar un intervalo de confianza al 95 % para la media de consumo de ese modelo de vehículos. (Modelo 2006 - Opción B)

Problema 5.7.3 (2 puntos) En cierta población humana, la media muestral \bar{X} de una característica se distribuye mediante una distribución normal. La probabilidad de que \bar{X} sea menor o igual a 75 es 0,58 y la de que \bar{X} sea mayor que 80 es 0,04. Hallar la media y la desviación típica de \bar{X} . (Tamaño muestral $n = 100$).

(Junio 2006 - Opción A)

Problema 5.7.4 (2 puntos) El tiempo de espera en minutos en una ventanilla se supone aproximado mediante una distribución $N(\mu, \sigma)$ con $\sigma = 3$ minutos. Se lleva a cabo un muestreo aleatorio simple de 10 individuos y se obtiene que la media muestral del tiempo de espera es de 5 minutos. Determinar un intervalo de confianza al 95 % para μ .

(Junio 2006 - Opción B)

Problema 5.7.5 (Puntuación máxima: 2 puntos)

La duración de la batería de cierto teléfono móvil se puede aproximar por una distribución normal con una desviación típica de 5 meses. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 baterías y se obtienen las siguientes duraciones (en meses):

33 34 26 37 30 39 26 31 36 19

Hallar un intervalo de confianza al 95 % para la duración media de este modelo de baterías.

(Septiembre 2006 - Opción A)

Problema 5.7.6 (Puntuación máxima: 2 puntos)

El peso en kg de los estudiantes universitarios de una gran ciudad se supone aproximado por una distribución normal con media 60 kg y desviación típica 8 kg. Se toman 100 muestras aleatorias simples de 64 estudiantes cada una. Se pide:

- La media y la desviación típica de la distribución de la media muestral
- ¿En cuántas de las 100 muestras cabe esperar una media entre 59 y 61 kg?

(Septiembre 2006 - Opción B)

5.8. Año 2007

Problema 5.8.1 (2 puntos) La edad a la que contraen matrimonio los hombres de la Isla de Barataria es una variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal de media 35 años y desviación típica de 5 años. Se elige aleatoriamente una muestra de 100 hombres de dicha isla. Sea \bar{X} la media muestral de la edad de casamiento.

- ¿Cuáles son la media y la varianza de \bar{X} ?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la edad media de casamiento de la muestra esté comprendida entre 36 y 37 años?

(Junio 2007 - Opción A)

Problema 5.8.2 (2 puntos) La duración de las rosas conservadas en agua en un jarrón es una variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal con una desviación típica de 10 horas. Se toma una muestra

aleatoria simple de 10 rosas y se obtienen las siguientes duraciones (en horas):

57, 49, 70, 40, 45, 44, 49, 32, 55, 45

Hallar un intervalo de confianza al 95 % para la duración media de las rosas. (Junio 2007 - Opción B)

Problema 5.8.3 (2 puntos) Se supone que la recaudación diaria de los comercios de un barrio determinado es una variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal de desviación típica 328 euros. Se ha extraído una muestra de 100 comercios de dicho barrio, obteniéndose que la recaudación diaria media asciende a 1248 euros. Calcular:

- a) El intervalo de confianza para la recaudación diaria media con un nivel de confianza del 99 %.
- b) El tamaño muestral mínimo necesario para conseguir, con un nivel de confianza del 95 %, un error en la estimación de la recaudación diaria menor de 127 euros.

(Septiembre 2007 - Opción A)

Problema 5.8.4 (2 puntos) El tiempo invertido en cenar por cada cliente de una cadena de restaurantes es una variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal con desviación típica de 32 minutos. Se quiere estimar la media de dicho tiempo con un error no superior a 10 minutos, y con un nivel de confianza del 95 %.

Determinar el tamaño mínimo muestral necesario para poder llevar a cabo dicha estimación.

(Septiembre 2007 - Opción B)

5.9. Año 2008

Problema 5.9.1 (2 puntos) La edad de la población que vive en residencias de mayores en Madrid sigue una distribución normal de desviación típica 7,3 años. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 50. ¿Se puede asegurar que la edad media de la población difiere en menos de 2 años de la media de la muestra con un nivel de confianza del 95 %?

(Modelo 2008 - Opción A)

Problema 5.9.2 (2 puntos) Para conocer la producción media de sus olivos, un olivarero escoge al azar 10 de ellos, pesa su producción de aceitunas, y obtiene los siguientes valores, expresados en kg:

175, 180, 210, 215, 186, 213, 190, 213, 184, 195

Sabemos que la producción sigue una distribución normal con desviación típica igual a 15,3.

Se pide estimar la producción media del olivar con un nivel de confianza del 95 %.

(Modelo 2008 - Opción B)

Problema 5.9.3 (2 puntos) El tiempo en minutos dedicado cada día a escuchar música por los estudiantes de secundaria de una cierta ciudad se supone que es una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 15 minutos. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 estudiantes y se obtienen los siguientes tiempos (en minutos):

91; 68; 39; 82; 55; 70; 72; 62; 54; 67

- Determinése un intervalo de confianza al 90 % para el tiempo medio dedicado a escuchar música por un estudiante.
- Calcúlese el tamaño muestral mínimo necesario para conseguir una estimación de la media del tiempo diario dedicado a escuchar música con un error menor que 5 minutos, con un nivel de confianza del 95 %.

(Junio 2008 - Opción A)

Problema 5.9.4 (2 puntos) El rendimiento por hectárea de las plantaciones de trigo en cierta región, se supone que es una variable aleatoria con una distribución normal con una desviación típica de 1 tonelada por hectárea. Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 64 parcelas con una superficie igual a una hectárea cada una, obteniéndose un rendimiento medio de 6 toneladas.

- ¿Puede asegurarse que el error de estimación del rendimiento medio por hectárea es menor de 0,5 toneladas, con un nivel de confianza del 98 %? Razónese.
- ¿Qué tamaño mínimo muestral debe tomarse para que el error de estimación sea menor que 0,5 toneladas con un nivel de confianza del 95 %

(Junio 2008 - Opción B)

Problema 5.9.5 (2 puntos) Se supone que la calificación en Matemáticas obtenida por los alumnos de una cierta clase es una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 1,5 puntos. Se elige una muestra aleatoria simple de tamaño 10 y se obtiene una suma de sus calificaciones igual a 59,5 puntos.

- a) Determínese un intervalo de confianza al 95 % para la calificación media de la clase.
- b) ¿Qué tamaño ha de tener la muestra para que el error máximo de la estimación sea de 0,5 puntos, con el nivel de confianza del 95 %.

(Septiembre 2008 - Opción A)

Problema 5.9.6 (2 puntos) La duración de la vida de una determinada especie de tortuga se supone que es una variable aleatoria, con distribución normal de desviación típica igual a 10 años. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 tortugas y se obtienen las siguientes duraciones, en años:

46, 38, 59, 29, 34, 32, 38, 21, 44, 34

- a) Determínese un intervalo de confianza al 95 % para la vida media de dicha especie de tortugas.
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra observada para que el error de la estimación de la vida media no sea superior a 5 años, con un nivel de confianza del 90 %

(Septiembre 2008 - Opción B)

5.10. Año 2009

Problema 5.10.1 (2 puntos) Se supone que el peso de los niños recién nacidos en una cierta región es una variable aleatoria con distribución normal de media 3,25 kg y desviación típica 0,8 kg. Se elige aleatoriamente una muestra de 64 niños recién nacidos en esa región. Sea \bar{X} la media muestral de los pesos observados.

- a) ¿Cuáles son la media y la desviación típica de \bar{X} ?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de la muestra esté comprendido entre 3,3 kg y 3,5 kg?

(Modelo 2009 - Opción A)

Problema 5.10.2 (2 puntos) Se han elegido al azar 10 televisores de un taller de electrónica y se ha anotado el número de horas que se han necesitado para su reparación. Los resultados han sido:

7, 5, 8, 2, 4, 7, 4, 1, 6, 6

Se supone que el número de horas de reparación de este tipo de televisores es una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 1,5 horas.

- a) Determínese un intervalo de confianza del 90 % para el tiempo medio de reparación.
- b) ¿Que tamaño debe tener la muestra para que el error máximo de la estimación sea 0,5 horas con el mismo nivel de confianza?

(Modelo 2009 - Opción B)

Problema 5.10.3 (2 puntos) Se supone que el gasto mensual dedicado al ocio por una determinada familia de un determinado país se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 55 euros. Se ha elegido una muestra aleatoria de 81 familias, obteniéndose un gasto medio de 320 euros.

- a) ¿Se puede asegurar que el valor absoluto del error de la estimación del gasto medio por familia mediante la media de la muestra es menor que 10 euros con un grado de confianza del 95 %?
- b) ¿Cuál es el tamaño muestral mínimo que debe tomarse para poder asegurarlo?

(Junio 2009 - Opción A)

Problema 5.10.4 (2 puntos) Se supone que la cantidad de agua (en litros) recogida cada día en una estación meteorológica se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 2 litros. Se elige una muestra aleatoria simple y se obtiene las siguientes cantidades de agua recogidas cada día (en litros):

9, 1; 4, 9; 7, 3; 2, 8; 5, 5; 6, 0; 3, 7; 8, 6; 4, 5; 7, 6

- a) Determínese un intervalo de confianza para la cantidad media de agua recogida cada día en dicha estación, con un grado de confianza del 95 %.
- b) Calcúlese el tamaño muestral mínimo necesario para que al estimar la media del agua recogida cada día en la estación meteorológica mediante dicha muestra, la diferencia en valor absoluto entre ambos valores sea inferior a 1 litro, con un grado de confianza del 98 %.

(Junio 2009 - Opción B)

Problema 5.10.5 (2 puntos) Se supone que el tiempo de una conversación en un teléfono móvil se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 1,32 minutos. Se desea estimar la media del tiempo de las conversaciones mantenidas con un error inferior o igual en valor absoluto a 0,5 minutos y con un grado de confianza del 95 %.

- a) Calcúlese el tamaño mínimo de la muestra que es necesario observar para llevar a cabo dicha estimación mediante la media muestral.
- b) Si se supone que la media del tiempo de las conversaciones es de 4,36 minutos y se elige una muestra aleatoria simple de 16 usuarios, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de las conversaciones de la muestra esté comprendido entre 4 y 5 minutos?

(Septiembre 2009 - Opción A)

Problema 5.10.6 (2 puntos) Se supone que la estancia (en días) de un cierto hospital se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 9 días. De una muestra aleatoria simple formada por 20 pacientes, se ha obtenido una media muestral igual a 8 días.

- a) Determínese un intervalo de confianza del 95 % para la estancia media de un paciente en dicho hospital.
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño muestral mínimo que ha de observarse para que dicho intervalo de confianza tenga una longitud total inferior o igual a 4 días?

(Septiembre 2009 - Opción B)

5.11. Año 2010

Problema 5.11.1 (2 puntos) Se supone que la duración de una bombilla fabricada por una cierta empresa se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media 900 horas y desviación típica 80 horas. La empresa vende 1000 lotes de 100 bombillas cada uno. ¿En cuántos lotes puede esperarse que la duración media de las bombillas que componen el lote sobrepase 910 horas?

(Modelo 2010 - Opción A)

Problema 5.11.2 (2 puntos) La temperatura corporal de cierta especie de aves se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de media $40,5^{\circ}\text{C}$ y desviación típica $4,9^{\circ}\text{C}$. Se elige una muestra aleatoria simple de 100 aves de esa especie. Sea \bar{X} la media muestral de las temperaturas observadas.

- a) ¿Cuáles son la media y la varianza de \bar{X} ?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura media de dicha muestra esté comprendida entre $39,9^{\circ}\text{C}$ y $41,1^{\circ}\text{C}$?

(Modelo 2010 - Opción B)

Problema 5.11.3 (2 puntos) Se supone que el tiempo de vida útil en miles de horas (Mh) de un cierto modelo de televisor, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 0,5 Mh. Para una muestra aleatoria simple de 4 televisores de dicho modelo, se obtiene una media muestral de 19,84 Mh de vida útil.

- a) Hállese un intervalo de confianza al 95 % para el tiempo de vida útil medio de los televisores de dicho modelo.
- b) Calcúlese el tamaño muestral mínimo necesario para que el valor absoluto del error de la estimación de la media poblacional mediante la media muestral sea inferior a 0,2 Mh con probabilidad mayor o igual que 0,95.

(Junio 2010 - Opción A)

Problema 5.11.4 (2 puntos) Se supone que el tiempo de espera de una llamada a una línea de atención al cliente de una cierta empresa se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 0,5 minutos. Se toma una muestra aleatoria simple de 100 llamadas y se obtiene un tiempo medio de espera igual a 6 minutos.

- a) Determínese un intervalo de confianza al 95 % para el tiempo medio de espera de una llamada a dicha línea de atención al cliente.
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño muestral mínimo que debe observarse para que dicho intervalo de confianza tenga una longitud total igual o inferior a 1 minuto?

(Junio 2010 - Opción B)

Problema 5.11.5 (2 puntos) Se considera una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 320. Se toma una muestra aleatoria simple de 36 elementos.

- a) Calcúlese la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media de la distribución normal sea mayor o igual que 50.
- b) Determínese el intervalo de confianza del 95 % para la media de la distribución normal, si la media muestral es igual a 4820.

(Septiembre 2010 - Opción A)

Problema 5.11.6 (2 puntos) Para estimar la media de una población con distribución normal de desviación típica igual a 5, se ha extraído una muestra aleatoria simple de tamaño 100, con la que se ha obtenido el intervalo de confianza (173,42;175,56) para dicha media poblacional.

- a) Calcúlese la media de la muestra seleccionada.
- b) Calcúlese el nivel de confianza del intervalo obtenido.

(Septiembre 2010 - Opción B)

5.12. Año 2011

Problema 5.12.1 (2 puntos) Se supone que el nivel de glucosa en sangre de los individuos de la población (medido en miligramos por decilitro) se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica 35 mg/dl . ¿Cuál es el tamaño muestral mínimo que permite garantizar que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y μ es menor que 20 mg/dl con una probabilidad mayor o igual a $0,98$?

(Modelo 2011 - Opción A)

Problema 5.12.2 (2 puntos) Se considera una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica $\sigma = 2$. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 25 y se obtiene una media muestral igual a 12.

- a) Determínese un intervalo de confianza al 90% para estimar la media de la variable aleatoria.
- b) Determínese el tamaño mínimo que ha de tener la muestra para que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la población y la media muestral sea menor o igual que $0,1$ con un nivel de confianza de al menos el 95% .

(Modelo 2011 - Opción B)

Problema 5.12.3 (2 puntos) Se supone que el tiempo medio diario dedicado a ver TV en una cierta zona se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica 5 minutos. Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 400 espectadores de TV en dicha zona, obteniéndose que el tiempo medio diario dedicado a ver TV es de 3 horas.

- a) Determínese un intervalo de confianza para μ con un nivel de confianza del 95% .
- b) ¿Cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error en la estimación de μ sea menor o igual que 3 minutos, con un nivel de confianza del 90% ?

(Junio 2011 - Opción A)

Problema 5.12.4 (2 puntos) Se supone que el precio (en euros) de un refresco se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 0,09. Se toma una muestra aleatoria simple del precio del refresco en 10 establecimientos y resulta:

1,50; 1,60; 1,10; 0,90; 1,00; 1,60; 1,40; 0,90; 1,30; 1,20

- a) Determínese un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- b) Calcúlese el tamaño mínimo que ha de tener la muestra elegida para que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la muestral y la μ sea menor o igual que 0,10 euros con probabilidad mayor o igual que 0,99.

(Junio 2011 - Opción B)

Problema 5.12.5 (2 puntos). Se supone que la presión diastólica en una determinada población se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media 98 mm y desviación típica 15 mm. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 9.

- a) Calcúlese la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 100 mm.
- b) Si se sabe que la media muestral es mayor que 100 mm, ¿cuál es la probabilidad de que sea también menor que 104 mm?

(Septiembre 2011 - Opción A)

Problema 5.12.6 (2 puntos). Para determinar el coeficiente de inteligencia θ de una persona se le hace contestar un conjunto de tests y se obtiene la media de sus puntuaciones. Se supone que la calificación de cada test se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media θ y desviación típica 10.

- a) Para una muestra aleatoria simple de 9 tests, se ha obtenido una media muestral igual a 110. Determínese un intervalo de confianza para θ al 95 %.
- b) ¿Cuál es el número mínimo de tests que debería realizar la persona para que el valor absoluto del error en la estimación de su coeficiente de inteligencia sea menor o igual que 5, con el mismo nivel de confianza?

(Septiembre 2011 - Opción B)

Problema 5.12.7 (2 puntos). Se supone que la altura (en cm) que alcanza la espuma de un cierto detergente para lavadoras durante un lavado estándar se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 1,5 cm. Una muestra aleatoria simple de 10 lavados de ese tipo ha dado las siguientes alturas de espuma:

7; 4; 4; 5; 7; 6; 2; 8; 6; 1

- Determinése un intervalo de confianza del 90 % para μ .
- ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra para que el valor absoluto del error máximo en la estimación sea de 0,5 cm con el mismo nivel de confianza?

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción A)

Problema 5.12.8 (2 puntos). Se supone que la estatura de los individuos de una cierta población se puede aproximar por una variable aleatoria X con distribución normal de media 170 cm y desviación típica 4 cm.

- Se extrae de dicha población una muestra aleatoria simple de 16 individuos. Calcúlese $P(X < 167)$.
- Se extrae de dicha población una muestra aleatoria simple y resulta que $P(X > 172) = 0,0062$. Determinése el tamaño de la muestra extraída.

(Septiembre 2011 (Reserva)- Opción B)

5.13. Año 2012

Problema 5.13.1 (2 puntos) Se supone que la concentración de CO_2 en el aire de una determinada región, medida en partes por millón (ppm), se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 20 ppm.

- Calcúlese el número mínimo de observaciones necesarias para que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la población y la media muestral sea menor o igual que 2 ppm con un nivel de confianza mayor o igual que el 95 %.
- Determinése un intervalo de confianza del 95 % para la concentración media de CO_2 en el aire de la región si la muestra elegida contiene 121 observaciones y la concentración media muestral es igual a 350 ppm.
 CO_2

(Modelo 2012 - Opción A)

Problema 5.13.2 (2 puntos) Se supone que la tensión de un tipo de línea eléctrica se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media $\mu = 100V$ y desviación típica $\sigma = 10V$. ¿Cuál es la distribución de la tensión media de cuatro líneas eléctricas de ese tipo, tomadas al azar y con independencia?
(Modelo 2012 - Opción B)

Problema 5.13.3 (2 puntos) Se supone que el peso en kilogramos de los alumnos de un colegio de Educación Primaria el primer día del curso se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 2,8 kg. Una muestra aleatoria simple de 8 alumnos de ese colegio proporciona los siguientes resultados (en kg):

26 27,5 31 28 25,5 30,5 32 31,5.

- Determinése un intervalo de confianza con un nivel del 90 % para el peso medio de los alumnos de ese colegio el primer día de curso.
- Determinése el tamaño muestral mínimo necesario para que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea menor o igual que 0,9 kg con un nivel de confianza del 97 %.

(Junio 2012 - Opción A)

Problema 5.13.4 (2 puntos) Se supone que el gasto que hacen los individuos de una determinada población en regalos de Navidad se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 45 euros.

- Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene el intervalo de confianza (251,6 ; 271,2) para μ , con un nivel de confianza del 95 %. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.
- Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 64 para estimar μ . Calcúlese el error máximo cometido por esa estimación con un nivel de confianza del 90 %.

(Junio 2012 - Opción B)

Problema 5.13.5 (2 puntos) El consumo anual de carne en un cierto país se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal con desviación típica 16 kg.

- Se toma una muestra aleatoria simple de 64 residentes y se obtiene un consumo medio de 42 kg de carne al año. Determinése un intervalo de confianza con un nivel del 90 % para el consumo anual medio de carne en dicho país.

- b) ¿Qué tamaño mínimo debería tener la muestra para garantizar, con el mismo nivel de confianza, que el error de la estimación del consumo anual medio sea menor que 1 kg?

(Junio 2012(coincidente) - Opción A)

Problema 5.13.6 (2 puntos) Se considera una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica σ . Sea \bar{X} la media en una muestra aleatoria simple de tamaño 100 elementos.

- a) Determinése el valor de σ sabiendo que $I = (125, 2; 144, 8)$ es un intervalo de confianza con un nivel del 95 % para la media poblacional μ .
- b) Si $\sigma = 20$, calcúlese la probabilidad $P(1 < \mu - \bar{X} < 4)$.

(Junio 2012(coincidente) - Opción B)

Problema 5.13.7 (2 puntos) La duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica igual a 3000 kilómetros.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 100 neumáticos y se obtiene una media muestral de 48000 kilómetros. Determinése un intervalo de confianza con un nivel del 90 % para μ .
- b) Calcúlese el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la muestra y μ sea menor o igual a 1000 kilómetros con probabilidad mayor o igual que 0,95.

(Septiembre 2012 - Opción A)

Problema 5.13.8 (2 puntos) El tiempo de espera para ser atendido en un cierto establecimiento se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica igual a 3 minutos. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 121.

- a) Calcúlese la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la muestra y μ sea mayor que 0,5 minutos.
- b) Determinése un intervalo de confianza con un nivel del 95 % para μ , si la media de la muestra es igual a 7 minutos.

(Septiembre 2012 - Opción B)

5.14. Año 2013

Problema 5.14.1 (2 puntos) El peso en gramos del contenido de las cajas de cereales de una cierta marca se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica igual a 5 gramos. Se toma una muestra de tamaño 144.

- Calcúlese la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre la media de la muestra y μ sea menor de 1 gramo.
- Si la media muestral obtenida es igual a 499,5 gramos, determínese un intervalo de confianza con un nivel del 90 % para el peso medio de ese tipo de cajas de cereales.

(Modelo 2013 - Opción A)

Problema 5.14.2 (2 puntos) La altura de los árboles de una determinada comarca se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida y varianza 25 cm. Se toma una muestra aleatoria simple y, para un nivel de confianza del 95 %, se construye un intervalo de confianza para la media poblacional cuya amplitud es de 2,45 cm.

- Determínese el tamaño de la muestra seleccionada.
- Determínese el límite superior y el inferior del intervalo de confianza si la altura media para la muestra seleccionada fue de 170 cm.

(Modelo 2013 - Opción B)

Problema 5.14.3 (2 puntos) El número de megabytes (Mb) descargados mensualmente por el grupo de clientes de una compañía de telefonía móvil con la tarifa AA se puede aproximar por una distribución normal con media 3,5 Mb y una desviación típica igual a 1,4 Mb . Se toma una muestra aleatoria de tamaño 24.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea inferior de 3,37 Mb ?
- Supóngase ahora que la media poblacional es desconocida y que la media muestral toma el valor de 3,42 Mb . Obténgase un intervalo de confianza al 95 % para la media de la población.

(Junio 2013 - Opción A)

Problema 5.14.4 (2 puntos) La duración en horas de un determinado tipo de bombillas se puede aproximar por una distribución normal de media μ y desviación típica igual a 1940 h. Se toma una muestra aleatoria simple.

- a) ¿Qué tamaño muestral se necesitaría como mínimo para que, con nivel de confianza del 95 %, el valor absoluto de la diferencia entre μ y la duración media observada \bar{X} de esas bombillas sea inferior a 100 h?
- b) Si el tamaño de la muestra es 225 y la duración media observada \bar{X} es de 12415 h, obténgase un intervalo de confianza al 90 % para μ .

(Junio 2013 - Opción B)

Problema 5.14.5 (2 puntos) La altura en centímetros de los individuos de una población se puede aproximar por una distribución normal de media μ y desviación típica igual a 20 cm.

- a) En una muestra aleatoria simple de 500 individuos se ha obtenido una altura media de 174 cm. Obténgase un intervalo de confianza al 95 % para μ
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el correspondiente intervalo de confianza para μ ; al 90 %, tenga de amplitud a lo sumo 5 cm?

(Junio 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 5.14.6 (2 puntos) Una envasadora empaqueta naranjas en bolsas. Para realizar un control de calidad, se tomó una muestra del peso real de 8 bolsas y se obtuvieron los siguientes resultados:

2,4 1,8 2 2,4 2,2 2 1,6 2,2

El peso de las bolsas que salen de esa planta de envasado se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica 0,5 kg.

- a) Obténgase un intervalo de confianza, al 95 %, para la media poblacional μ
- b) Hállese el error máximo que se cometería en la estimación de μ usando el intervalo de confianza anterior.

(Junio 2013 (coincidente)- Opción B)

Problema 5.14.7 (2 puntos) El tiempo de renovación de un teléfono móvil, expresado en años, se puede aproximar mediante una distribución normal con desviación típica 0,4 años.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 400 usuarios y se obtiene una media muestral igual a 1,75 años. Determínese un intervalo de confianza al 95 % para el tiempo medio de renovación de un teléfono móvil.

- b) Determinése el tamaño muestral mínimo necesario para que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea menor o igual a 0,02 años con un nivel de confianza del 90 % .

(Septiembre 2013 - Opción A)

Problema 5.14.8 (2 puntos) Se considera una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 210. Se toma una muestra aleatoria simple de 64 elementos.

- a) Calcúlese la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre la media muestral y μ sea mayor o igual que 22.
- b) Determinése un intervalo de confianza del 99 % para μ , si la media muestral es igual a 1532.

(Septiembre 2013 - Opción B)

Problema 5.14.9 (2 puntos) La longitud alcanzada por un lanzador de disco se puede aproximar por una variable aleatoria normal con media μ desconocida y desviación típica igual a 2 metros. El lanzador hace 10 lanzamientos en una prueba atlética. Considérense esos 10 lanzamientos como una muestra aleatoria simple.

- a) Calcúlese la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre la distancia media obtenida por el lanzador en los 10 intentos y μ sea menor que 0,75 metros.
- b) Si la media de las distancias alcanzadas en los lanzamientos durante la prueba ha sido de 65 metros, determinése un intervalo de confianza con un nivel del 95 % para la distancia media μ de los lanzamientos de este atleta.

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción A)

Problema 5.14.10 (2 puntos) El peso de las lubinas de un año producidas en una piscifactoría se puede aproximar por una distribución normal con media 600 gramos y desviación típica 100 gramos. Las lubinas de un año están en un recinto aislado.

- a) Considérese una muestra aleatoria simple de 20 lubinas de un año en la piscifactoría, calcúlese la probabilidad de que su peso medio sea superior a 650 gramos.
- b) Se toma una muestra aleatoria simple de 100 lubinas de un año. Hállese el nivel de confianza con el que se ha calculado el siguiente intervalo de confianza para la media: (580,4; 619,6).

(Septiembre 2013 (coincidente)- Opción B)

5.15. Año 2014

Problema 5.15.1 (2 puntos) El contenido en alquitrán de una determinada marca de cigarrillos se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica 4 mg.

- Se toma una muestra aleatoria de tamaño 20 y se obtiene que su media muestral es de 22 mg. Determínese un intervalo de confianza al 90 % para el contenido medio de alquitrán en un cigarrillo de la citada marca.
- Determínese el tamaño mínimo de la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor que 0,5 mg, con un nivel de confianza del 90 %.

(Modelo 2014 - Opción A)

Problema 5.15.2 (2 puntos) El n° de kilómetros recorridos en un día determinado por un conductor de una empresa de transportes se puede aproximar por una variable aleatoria X con una distribución normal de media μ .

- Se obtuvo una muestra aleatoria simple, con los siguientes resultados:

40 28 41 102 95 33 108 20 64

Determínese un intervalo de confianza al 95 % para μ si la variable aleatoria X tiene una desviación típica igual a 30 km.

- ¿Cuál sería el error de estimación de μ usando un intervalo de confianza con un nivel del 90 % , construido a partir de una muestra de tamaño 4, si la desviación típica de la variable aleatoria X fuera de 50 km?

(Modelo 2014 - Opción B)

Problema 5.15.3 (2 puntos) La longitud, en milímetros (mm), de los individuos de una determinada colonia de gusanos de seda se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica igual a 3 mm .

- Se toma una muestra aleatoria simple de 48 gusanos de seda y se obtiene una media muestral igual a 36 mm . Determínese un intervalo de confianza para la media poblacional de la longitud de los gusanos de seda con un nivel de confianza del 95 %.
- Determínese el tamaño muestral mínimo necesario para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral sea menor o igual que 1 mm con un nivel de confianza del 90 %.

(Junio 2014 - Opción A)

Problema 5.15.4 (2 puntos) El consumo mensual de leche (en litros) de los alumnos de un determinado colegio se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 3$ litros.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene el intervalo de confianza (16, 33; 19, 27) para estimar μ , con un nivel de confianza del 95 %. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.
- b) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 64. Calcúlese el error máximo cometido en la estimación de μ mediante la media muestral con un nivel de confianza del 95 %.

(Junio 2014 - Opción B)

Problema 5.15.5 (2 puntos) La cantidad de azúcar, en gramos, del contenido de las botellas de un litro de una conocida bebida refrescante se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica igual a 2 gramos.

- a) Se ha realizado un análisis de control de los contenidos de una muestra aleatoria simple de 100 de esas botellas y se ha obtenido una cantidad media de azúcar igual a 70 gramos. Obténgase un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- b) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el correspondiente intervalo de confianza para μ , al 90 %, tenga de amplitud a lo sumo 2 gramos?

(Junio 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 5.15.6 (2 puntos) El peso, en gramos, del contenido de las cajas de una conocida marca de cereales se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica 10 gramos.

- a) Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 20 de esas cajas de cereales para realizar un estudio y la media de los pesos de sus contenidos ha sido $\bar{x} = 500$. Calcúlese un intervalo de confianza del 95 % para μ .
- b) Si sabemos que $\mu = 500$, calcúlese la probabilidad de que la media muestral de los pesos de una muestra aleatoria simple de 20 cajas sea inferior a 495 gramos.

(Junio 2014 (coincidente)- Opción B)

Problema 5.15.7 (2 puntos) La estatura en centímetros (cm) de los varones mayores de edad de una determinada población se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 16$ cm.

- a) Se tomó una muestra aleatoria simple de 625 individuos obteniéndose una media muestral $\bar{x} = 169$ cm. Hállese un intervalo de confianza al 98 % para μ .
- b) ¿Cuál es el mínimo tamaño muestral necesario para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral sea menor que 4 cm, con un nivel de confianza del 90 %?

(Septiembre 2014 - Opción A)

Problema 5.15.8 (2 puntos) El mínimo tamaño muestral necesario para estimar la media de una determinada característica de una población que puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica σ , con un error máximo de 3,290 y un nivel de confianza del 90 %, supera en 7500 unidades al que se necesitaría si el nivel de confianza fuera del 95 % y el error máximo fuera de 7,840.

Exprésense los tamaños muestrales en función de la desviación típica σ y calcúlense la desviación típica de la población y los tamaños muestrales respectivos.

Nota: Utilícese $z_{0,05} = 1,645$.

(Septiembre 2014 - Opción B)

Problema 5.15.9 (2 puntos) La capacidad vital forzada es una medida para calcular el volumen de los pulmones de las personas adultas que se puede aproximar por una variable aleatoria X con una distribución normal de media desconocida μ y desviación típica 1 litro.

- a) Se tomó una muestra aleatoria simple de 144 personas adultas que dieron una media de capacidad vital forzada de 4 litros. Determínese un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- b) ¿Cuál es el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral obtenido a partir de una muestra de tamaño 81, con un nivel de confianza del 99 % ?

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción A)

Problema 5.15.10 (2 puntos) El peso en kilogramos de la cabeza humana en adultos se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica 0,75 kilogramos.

- a) Una muestra aleatoria simple de 16 individuos a los que se les ha realizado una densitometría, prueba diagnóstica que permite medir el peso de la cabeza, proporcionó una media muestral de 5,137 kilogramos. Determínese un intervalo de confianza al 98 % para μ .
- b) ¿Cuántas densitometrías como mínimo deben realizarse para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral sea menor que 100 gramos, con el mismo nivel de confianza del 98 %?

(Septiembre 2014 (coincidente)- Opción B)

5.16. Año 2015

Problema 5.16.1 (2 puntos) El consumo familiar diario de electricidad (en kW) en cierta ciudad se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica 1,2 kW. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 50. Calcúlese:

- a) La probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 6 kW y 6,6 kW, si $\mu = 6,3kW$.
- b) El nivel de confianza con el que se ha calculado el intervalo de confianza (6, 1; 6, 9) para la media del consumo familiar diario.

(Modelo 2015 - Opción A)

Problema 5.16.2 (2 puntos) Se ha tomado una muestra aleatoria simple de diez pacientes y se ha anotado el número de días que han recibido tratamiento para los trastornos del sueño que sufren. Los resultados han sido:

290 275 290 325 285 365 375 310 290 300

Se sabe que la duración, en días, del tratamiento se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica 34,5 días.

- a) Determínese un intervalo de confianza con un nivel del 95 % para μ .
- b) b) ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor de 10 días, con un nivel de confianza del 95 %?

(Modelo 2015 - Opción B)

Problema 5.16.3 (2 puntos) El tiempo de reacción ante un obstáculo imprevisto de los conductores de automóviles de un país, en milisegundos (ms), se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 250 ms$.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene un intervalo de confianza $(701; 799)$, expresado en ms , para μ con un nivel del 95%. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.
- b) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 25. Calcúlese el error máximo cometido en la estimación de μ mediante la media muestral con un nivel de confianza del 80%.

(Junio 2015 - Opción A)

Problema 5.16.4 (2 puntos) La duración de cierto componente electrónico, en horas (h), se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica igual a 1000 h.

- a) Se ha tomado una muestra aleatoria simple de esos componentes electrónicos de tamaño 81 y la media muestral de su duración ha sido $\bar{x} = 8000h$. Calcúlese un intervalo de confianza al 99% para μ .
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral este comprendida entre 7904 y 8296 horas para una muestra aleatoria simple de tamaño 100 si sabemos que $\mu = 8100h$?

(Junio 2015 - Opción B)

Problema 5.16.5 (2 puntos) El consumo de agua, medido en litros, en una ducha puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica $\sigma = 10$ litros.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 25 duchas, obteniéndose una media muestral $\bar{x} = 100$ litros. Determinése un intervalo de confianza al 95% para μ .
- b) Determinése el tamaño muestral mínimo necesario para que al estimar μ mediante la media muestral, el error cometido sea menor que 2 litros, con un nivel de confianza del 99%.

(Junio 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 5.16.6 (2 puntos) El nivel de colesterol total en sangre en adultos de 50 años, medido en miligramos por decilitro (mg/dl), se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica $\sigma = 20mg/dl$.

- a) A partir de una muestra aleatoria simple se obtiene el intervalo de confianza $(191, 2; 210, 8)$, expresado en mg/dl , para estimar μ con un nivel de confianza del 95%. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra considerada.

- b) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 100. Calcúlese la amplitud del intervalo de confianza al 98 % para μ .

(Junio 2015 (coincidente)- Opción B)

Problema 5.16.7 (2 puntos) La cantidad de fruta, medida en gramos, que contienen los botes de mermelada de una cooperativa con producción artesanal se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica de 10 gramos.

- a) Se seleccionó una muestra aleatoria simple de 100 botes de mermelada, y la cantidad total de fruta que contenían fue de 16.000 gramos. Determínese un intervalo de confianza al 95 % para la media μ .
- b) A partir de una muestra aleatoria simple de 64 botes de mermelada se ha obtenido un intervalo de confianza para la media μ con un error de estimación de 2,35 gramos. Determínese el nivel de confianza utilizado para construir el intervalo.

(Septiembre 2015 - Opción A)

Problema 5.16.8 (2 puntos) En cierta región, el gasto familiar realizado en gas natural, medido en euros, durante un mes determinado se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de media μ y desviación típica 75 euros.

- a) Determínese el mínimo tamaño muestral necesario para que al estimar la media del gasto familiar en gas natural, μ , mediante un intervalo de confianza al 95 %, el error máximo cometido sea inferior a 15 euros.
- b) Si la media del gasto familiar en gas natural, μ , es de 250 euros y se toma una muestra aleatoria simple de 81 familias, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, \bar{X} , sea superior a 230 euros?

(Septiembre 2015 - Opción B)

Problema 5.16.9 (2 puntos) La producción por hectárea, medida en kg/ha (kilogramos por hectárea) del olivar de alta densidad en cultivo intensivo de Córdoba se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica igual a 1000 kg/ha .

- a) A partir de una muestra aleatoria simple de 400 parcelas de una hectárea se ha obtenido (9917,75; 10082,25) como intervalo de confianza para la media μ , expresado en kg/ha . Determínese la media de la muestra y el nivel de confianza utilizado para construir el intervalo.
- b) Determínese el tamaño mínimo de una muestra aleatoria simple para que el correspondiente intervalo de confianza para μ al 98 % tenga de amplitud a lo sumo 50 kg/ha .

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción A)

Problema 5.16.10 (2 puntos) El peso, en gramos, del contenido de las bolsas de patatas fritas de una cierta marca se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica 10 gramos.

- a) Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 50 de esas bolsas de patatas y la media de pesos de sus contenidos ha sido de $\bar{X} = 100$ gramos. Calcúlese un intervalo de confianza al 90 % para μ .
- b) Si sabemos que $\mu = 100$ gramos, calcúlese la probabilidad de que el total de los pesos de los contenidos de una muestra aleatoria simple de 25 bolsas sea menor o igual que 2625 gramos.

(Septiembre 2015 (coincidente)- Opción B)

5.17. Año 2016

Problema 5.17.1 (2 puntos) El tiempo diario que los adultos de una determinada ciudad dedican a actividades deportivas, expresado en minutos, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 20$ minutos.

- a) Para una muestra aleatoria simple de 250 habitantes de esa ciudad se ha obtenido un tiempo medio de dedicación a actividades deportivas de 90 minutos diarios. Calcúlese un intervalo de confianza al 90 % para μ .
- b) ¿Qué tamaño mínimo debe de tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral sea menor que 1 minuto con el mismo nivel de confianza del 90 %?

(Modelo 2016 - Opción A)

Problema 5.17.2 (2 puntos) El precio (en euros) del metro cuadrado de las viviendas de un determinado municipio se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 650$ euros.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene un intervalo de confianza (2265,375; 2424,625) para μ , con un nivel de confianza del 95 %. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.

- b) Tomamos una muestra aleatoria simple de tamaño 225. Calcúlese el error máximo cometido en la estimación de μ por la media muestral con un nivel de confianza del 99 %.

(Modelo 2016 - Opción B)

Problema 5.17.3 (2 puntos) La producción diaria de leche, medida en litros, de una granja familiar de ganado vacuno se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 50$ litros.

- a) Determínese el tamaño mínimo de una muestra aleatoria simple para que el correspondiente intervalo de confianza para μ al 95 % tenga una amplitud a lo sumo de 10 litros.
- b) Se toman los datos de producción de 25 días escogidos al azar. Calcúlese la probabilidad de que la media de las producciones obtenidas, \bar{X} , sea menor o igual a 940 litros si sabemos que $\mu = 950$ litros.

(Junio 2016 - Opción A)

Problema 5.17.4 (2 puntos) El peso por unidad, en gramos, de la gamba roja de Palamós, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 5$ gramos.

- a) Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 25 gambas y la media de sus pesos ha sido $\bar{X} = 70$ gramos. Calcúlese un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- b) Si sabemos que $\mu = 70$ gramos, y se consideran los pesos de las 12 gambas de una caja como una muestra aleatoria simple, calcúlese la probabilidad de que el peso total de esas 12 gambas sea mayor o igual que 855 gramos.

(Junio 2016 - Opción B)

Problema 5.17.5 (2 puntos) El peso en kilogramos (kg) de los recién nacidos en 2014 en cierta ciudad puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 0,60$ kg.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 100 y se obtiene un peso medio para los recién nacidos de esa ciudad de $\bar{X} = 3,250$ kg. Determínese un intervalo de confianza al 98 % para μ .
- b) Determínese el tamaño mínimo de la muestra aleatoria simple para que el error cometido en la estimación de μ , con un nivel de confianza del 95 %, sea a lo sumo de 0,2 kg.

(Junio 2016 - Opción A (Coincidentes))

Problema 5.17.6 (2 puntos) La distancia diaria recorrida, en kilómetros (km), por un taxi en una gran ciudad puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media μ desconocida y desviación típica $\sigma = 16$ km.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 81 taxis y se obtiene el intervalo de confianza (159; 165). Determinése el nivel de confianza con el que se obtuvo dicho intervalo.
- b) Si la media de la distancia recorrida fuera $\mu = 160$ km, y se toma una muestra aleatoria simple de 64 taxis, calcúlese la probabilidad de que la media de la muestra, \bar{X} , sea mayor que 156 km.

(Junio 2016 - Opción B (Coincidentes))

Problema 5.17.7 (2 puntos) El tiempo, en minutos, que los empleados de unos grandes almacenes tardan en llegar a su casa se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica $\sigma = 5$.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 64 empleados y su media muestral es $\bar{X} = 30$ minutos. Determinése un intervalo de confianza al 95 % para μ .
- b) ¿Qué tamaño mínimo debe tener una muestra aleatoria simple para que el correspondiente intervalo de confianza para μ al 99 % tenga una amplitud a lo sumo de 10 minutos?

(Septiembre 2016 - Opción A)

Problema 5.17.8 (2 puntos) El tiempo, en meses, que una persona es socia de un club deportivo, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida μ y desviación típica $\sigma = 9$.

- a) Se toma una muestra aleatoria simple de 100 personas que han sido socias de ese club y se obtuvo una estancia media de $\bar{X} = 8'1$ meses. Determinése un intervalo de confianza al 90 % para μ .
- b) Sabiendo que para una muestra aleatoria simple de 144 personas se ha obtenido un intervalo de confianza (7'766; 10'233) para μ , determinése el nivel de confianza con el que se obtuvo dicho intervalo.

(Septiembre 2016 - Opción B)